

Lycoperdon brun d'ombre



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Lycoperdon umbrinum*

Famille: Autres > Lycoperdaceae > Lycoperdon

Caractéristiques du genre *Lycoperdon*: chapeau: piriforme, brunissant peu à peu à maturité, intérieur de la tête se transformant en masse de spore qui s'échappent quand une ouverture se déchire au sommet - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte, terrestre, rarement sur bois mort, voir *Calvatia*

- Chapeau:** 3-7cm, sphérique puis en forme d'ampoule ou piriforme, couverte d'aiguillons plus ou moins courts (disparaissant tardivement) réunis en pyramides de 4 à 6 courbés et de couleur brune au sommet sur une cuticule de couleur blanchâtre à crème puis beige et enfin brun ochracé. Les aiguillons sont longtemps persistants, laissant après leur disparition une cuticule lisse, brillante et sans aréole. Ejection des spores par ouverture d'un petit trou au sommet de l'endopéridium épais d'1mm
- Lamelles:** néant
- Pied:** sans anneau, plissé, se rétrécissant dans le prolongement du chapeau, de même couleur que celui-ci mais plus clair vers la base, également orné d'aiguillons de plus en plus courts disparaissant progressivement jusqu'à être absents vers la base
- Chair:** gléba blanche et compacte, devenant verdâtre puis brun-olivacé à la maturité des spores
- Odeur:** nulle
- Saveur:** nulle
- Habitat:** mai-novembre, principalement dans les bois de conifères, appréciant la présence des épicéas mais parfois aussi présent dans les bois mixtes et les feuillus, souvent en nombre sur coupes déjà anciennes de pessières, champignon à tendance acidophile
- Remarques:** sans être classé parmi les toxiques, ce *Lycoperdon* n'a pas les faveurs de la table
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Avant maturité champignon sphérique, semi-enterré ou au ras du sol > Pas de couche interne gélatineuse, à maturité sphère laissant échapper un nuage de spores > Couche externe blanche, souple > Champignon en forme de poire > Surface externe couverte de verrues ou aiguillons caducs > *Lycoperdon*

Photos:

