

# Tramète hirsute, Polypore hirsute



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

Nom latin: *Trametes hirsuta*

Famille: *A tubes > Coriolaceae > Trametes*

Caractéristiques du genre *Trametes* : chapeau: console ou rosette, chair toujours pâle - lames: tubes plus ou moins enfoncés dans la chair - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois ou parasite de blessure, provoque une pourriture blanche

**Synonymes:** *Coriolus hirsutus* var. *fibula*, *Trametes hirsuta* f. *fibula*, *Coriolus hirsutus* subsp. *fibula*, *Coriolus vellereus*, *Polystictus nigromarginatus*, *Trametes porioides*, *Polystictoides hirsutus*, *Coriolus hirtellus*, *Coriolus nigromarginatus*, *Microporus cinerellus*, *Microporus fibula*, *Microporus galbanatus*, *Microporus hirsutus*, *Microporus hirtellus*, *Microporus leveillei*, *Microporus nigromarginatus*, *Scindalma gourliei*, *Polystictus cinerescens*, *Trametes aurea*, *Coriolus fibula*, *Coriolus hirsutus*, *Polystictus cinerellus*, *Polystictus galbanatus*, *Polystictus leveillei*, *Fomes gourliei*, *Bjerkandera hirsuta*, *Hansenia hirsuta*, *Hansenia vellerea*, *Polyporus cinerellus*, *Polyporus leveillei*, *Polyporus gourliei*, *Polystictus fibula*, *Polystictus hirsutus*, *Polystictus hirtellus*, *Polystictus vellereus*, *Polyporus cinerascens*, *Polyporus cinerescens*, *Polyporus aureus*, *Polyporus galbanatus*, *Polyporus vellereus*, *Polyporus fibula*, *Boletus nigromarginatus*, *Polyporus hirsutus*, *Boletus fibula*, *Boletus hirsutus*

**Chapeau:** 3-12cm, rarement plus, dimidié, surfaces zonées concentriques de tons assez similaires, verdies par les algues pour les plus anciennes, l'ensemble du chapeau étant couvert de poils brillants, hirsutes. Marge fine, régulière à légèrement ondulante, blanchâtre, grise ou brune, finement feutrée

**Lamelles:** néant : tubes très fins et arrondis, de couleur blanchâtre devenant successivement jaunâtre, gris jaunâtre puis brunâtres

**Pied:** sans anneau, carpophore fixé au bois par un prolongement un peu plus épais

**Chair:** peu épaisse, compacte, liégeuse, sèche, blanche

**Odeur:** légèrement humique et dégageant de faibles senteurs anisées

**Saveur:** liégeuse

**Habitat:** août-novembre, essentiellement dans les parcs arborés et les bois de feuillus, appréciant particulièrement le cerisier et l'aulne

**Remarques:** soit isolément, soit en compagnie de plusieurs individus étagés sur le support. Trop coriace et particulièrement sec, il est classé parmi les non comestibles. Provoque une pourriture blanche.

**Confusion:** Tramète bossue (*Trametes gibbosa*)  
*essentiellement au stade juvénile*

**Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied latéral ou nul > Chair mince ou dure comme du bois > Tubes non violets > Pores ronds > Chapeaux multiples et flexibles > Chair très coriace > *Trametes*

**Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > *Coriolus* > *Coriolus hirsutus*

## Photos:

