

Tramète versicolore, Polypore versicolore, polypore de couleur variable



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:




NON COMESTIBLE

Nom latin: Trametes versicolor

Famille: A tubes > Coriolaceae > Trametes

Caractéristiques du genre Trametes : chapeau: console ou rosette, chair toujours pâle - lames: tubes plus ou moins enfoncés dans la chair - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois ou parasite de blessure, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** Trametes versicolor f. antarctica, Coriolus versicolor f. antarcticus, Coriolus versicolor f. azureus, Coriolus antarcticus, Trametes versicolor f. fuscata, Trametes versicolor f. nigrozonata, Trametes azurea, Antrodia pictilis, Coriolus pictus, Coriolus azureus, Coriolus neaniscus, Trametes unicolor f. rohlena, Trametes versicolor f. cyanea, Trametes versicolor f. producta, Trametes versicolor f. vitellinus, Polystictus castaneicola, Polystictus castanicola, Polystictus doidgeae, Polystictus doidgei, Polyporus irpiciformis, Polyporus picicola, Polyporus reisneri, Polyporus rohlena, Polyporus versicolor var. cyaneus, Polyporus versicolor var. productus, Polyporus versicolor var. rosophilus, Polystictus versicolor var. fuscatus, Polystictus versicolor var. nigricans, Polyporus luteovelutinus, Polystictoides castaneicola, Polystictoides castanicola, Polystictus corylicola, Polystictus inversus, Coriolus hirsutulus, Coriolus pectunculus, Coriolus pictilis, Microporus antarcticus, Microporus apophysatus, Microporus azureus, Microporus caesioglaucus, Microporus cristulatus, Microporus fuscatus, Microporus hirsutulus, Microporus neaniscus, Microporus nigricans, Microporus pectunculus, Microporus pictilis, Microporus subflavus, Microporus versicolor, Polystictus nigricans, Polyporus antarcticus, Polystictus antarcticus, Polystictus apophysatus, Polystictus cristulatus, Coriolus versicolor, Polystictus caesioglaucus, Polystictus fuscatus, Polystictus hirsutulus, Polystictus neaniscus, Polystictus pectunculus, Polystictus pictilis, Polystictus subflavus, Polyporus caesioglaucus, Bjerkandera versicolor, Polyporus cristulatus, Hansenia versicolor, Polyporus pictilis, Polystictus azureus, Polystictus versicolor, Polyporus apophysatus, Polyporus pectunculus, Polyporus subflavus, Polyporus hirsutulus, Polyporus versicolor, Polyporus versicolor var. fuscatus, Polyporus fuscatus, Sistotrema versicolor, Boletus atrofus, Boletus cyaneus, Agarico-suber versicolor, Cellularia cyathiformis, Boletus atrofus, Poria versicolor, Boletus versicolor
- Chapeau:** 4-15cm, en forme de console à surface veloutée se déployant en éventail, à marge ondulée, généralement en groupes imbriqués, de couleurs zonées allant du blanc au gris, au beige, au bleu-gris, gris violacé voire au noir, plus clair à blanchâtre à la marge
- Lamelles:** néant. Pores minuscules et d'abord blancs, devenant ensuite de couleur crème à jaunâtre voire parfois taché de jaunâtre ochracé pâle
- Pied:** néant
- Chair:** blanc pur, très fine de 1 à 3 mm, blanche, souple jeune puis coriace dure et cassante dans l'âge
- Odeur:** nulle
- Saveur:** nulle
- Habitat:** janvier-décembre, reste souvent en place très longtemps, parfois plusieurs années tant il est coriace. Affectionne particulièrement le bois mort de hêtres et de bouleaux mais on le trouve sur nombre d'autres essences d'arbre et même sur du bois de charpente non traité. sans doute le ou un des champignons le plus commun et le plus variable de nos sous-bois. Annuel, il peut cependant rester en place quelques années, en perdant petit à petit, ses couleurs chatoyantes
- Remarques:** provoque un genre de pourriture blanche, très active mais il ne se comporte pas en parasite. Se développe en étages superposés de plusieurs individus semblant s'imbriquer les uns dans les autres. Sa dureté est parfois telle qu'elle l'a amené autrefois à être utilisé comme bijou. Non comestible en raison, notamment, d'une chair coriace, il n'est toutefois pas classé parmi les espèces toxiques
- Confusion:** Polypore du sapin (Trichaptum abietinum)
Tramète: pores crème, Polypore: pores violets
Tramète multicolore (Trametes ochracea)
dont le chapeau ne comporte toutefois pas de zones concentriques de couleur bleutée à violacée
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chaire dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied latéral ou nul > Chair mince ou dure comme du bois > Tubes non violets > Pores ronds > Chapeaux multiples et flexibles > Chair très coriace > Trametes
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > Trametes > Trametes versicolor





Photos micro:

