

Cortinaire violet



Comestible, mais sans valeur

Nom latin: Cortinarius violaceus

Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius

Caractéristiques du genre Cortinarius : chapeau: aspect variable, restes de voile filamenteux (cortine) toujours présents, sec à visqueux, hygrophane ou non - lames: adnées, trame régulière - pied: épais, sec à visqueux - remarques: mycorrhizien

- Chapeau:** 2.5-15cm, bleu-violet ou violet sombre, entièrement et fortement velouté, cuticule sèche
- Lamelles:** d'abord violettes, puis colorée par la sporée couleur rouille
- Pied:** souvent en massue, de la même couleur que le chapeau
- Chair:** violette comme le chapeau
- Odeur:** évoquant le bois de cèdre singulière de cuir de Russie, de crayon à papier
- Saveur:** douce
- Habitat:** août-octobre, forêts de feuillus et résineux, presque sur tous les sols, généralement rare
- Remarques:** Si l'on considère que tout le champignon est intégralement violet, la confusion est peu probable. Comestible sans grand intérêt. Il peut donner un peu de couleur à un plat trop pâle, mais risque de colorer tout le plat de sa couleur. Unique espèce du sous-genre.
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non capanulé ou lamelles non grises > Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine > Chapeau non visqueux > Chapeau sec, fibrilleux ou lisse > Revêtement pelucheux > Couleur violette > Cortinarius

