

Cortinaire remarquable, Cortinaire de Berkeley



Bon comestible

Nom latin: Cortinarius praestans, Cortinarius Berkeleyi

Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Phlegmacium

Caractéristiques du genre Phlegmacium : chapeau: trapu, visqueux (rarement sec), non hygrophane - lames: adnées, trame régulière, jaunes, olive, violettes ou brun-roux - pied: épais, souvent bulbeux, sec, avec cortine double (au bord du bulbe et en haut) - remarques: mycorrhizien, les espèces jaune vif sont toxiques ou suspectes

- Chapeau:** 10-25cm, très globuleux, arrondi dans sa jeunesse puis convexe avec l'âge, visqueux par temps humide, cuticule brun-roux ou cuivrée à reflets violacés ou pourpres, avec plaques ou verrues plates de couleur lilas sur une partie seulement. Marge enroulée et floconneuses dans sa jeunesse, puis étalée et striée, cannelée avec l'âge, cuticule filamenteuse
- Lamelles:** épaisses et larges et passent du lilas à l'ocre et au brun rouille pour terminer (due à la présence des spores)
- Pied:** sans anneau, cortine bien nette, surtout au début, filamenteuse, teintée de lilas ou blanche. Pied robuste, massif et bulbeux. En haut, blanc ou lilas avec débris écaillé ou membraneux vers le bas faisant un dessin de guirlandes colorées
- Chair:** ferme et compacte, blanche teintée de jaune sous la cuticule et de lilas dans le pied
- Odeur:** agréable, suave
- Saveur:** douce
- Habitat:** août-octobre, bois de feuillus mêlés (hêtres, chênes, frênes) et parfois sous conifères, en zone humide, rare, en groupe
- Remarques:** Ce gros champignon imposant est le seul cortinaire qui ait une véritable valeur culinaire
- Confusion:** Cortinaire bleu violet (*Cortinarius cumatilis*)
marge cannelée
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non capanulé ou lamelles non grises > Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine > Chapeau visqueux > Pied non visqueux > Pied bulbeux, sans marge, massif > Phlegmacium