

Lenzite des poutres, Lenzite des clôtures, Polypore des clôtures



Comestible, mais sans valeur

Nom latin: Gloeophyllum sepiarium

Famille: A tubes > Coriolaceae > Gloeophyllum

Caractéristiques du genre Gloeophyllum : chapeau: généralement petit, plat, en éventail ou en console, parfois presque nul, chair mince, brun-roux à brun-cannelle, coriace à liégeuse, plus rarement compacte - lames: tubes souvent labyrinthiformes à lamelleux - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche

- Chapeau:** 3-10cm, épaisseur assez faible de 1 à 1,5 cm au maximum en arrière, généralement allongé, congrescent, soudé en rang, ou dimidié à presque circulaire, dessus du chapeau légèrement convexe, zoné de sillons concentriques, fauves, brun-roux, noircissant sur le tard, finement feutrés de "poils" raides, rudes au toucher, marge très fine, aiguë, incurvée, régulière à ondulante, d'une belle couleur jaune-orangée qui tranche du reste du carpophore
- Lamelles:** serrées, peu larges de 3 à 6 mm, irrégulières, transversales à radiales aux extrémités, réunies parfois pour former un réseau labyrinthiforme, concolores à la marge puis blanchissant doucement à partir de celle-ci dans la vétusté
- Pied:** sans anneau, néant
- Chair:** fine, coriace, à consistance de liège, rougeâtre puis brune
- Odeur:** nulle
- Saveur:** nulle
- Habitat:** janvier-décembre, bois morts de résineux (très rare sur feuillus): billes, tas de bois ou sur bois ouvragés, poutres, planches, barrières, ponts, coffrages, clôtures et charpentes, endroits clairs, aérés, ensoleillés aux sous-bois sombres et humides, provoque pourriture brune
- Remarques:** résiste parfaitement à la sécheresse
- Confusion:** Tramète multicolore (Trametes multicolor)
Tramète versicolore, Polypore versicolore, polypore de couleur variable (Trametes versicolor, Coriolus versicolor)
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied latéral ou nul > Chair mince ou dure comme du bois > Tubes non violets > Pores allongés au point de former de véritables lamelles coriaces > Gloeophyllum

