

Bolet orangé



Bon comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: *Leccinum aurantiacum*

Famille: A tubes > Boletaceae > Leccinum

Caractéristiques du genre *Leccinum* : chapeau: sec, mat à velouté, tout au plus un peu collant avec l'âge - lames: tubes facilement séparables, ventrus sur les vieux exemplaires - pied: généralement assez mince, réticulé - remarques: mycorrhizien

- Synonymes:** *Leccinum populinum*, *Leccinum leucopodium*, *Boletus salicola*, *Krombholziella salicola*, *Leccinum salicicola*, *Leccinum salicola*, *Boletus versipellis* var. *aurantiacus*, *Trachypus aurantiacus*, *Krombholziella aurantiaca*, *Krombholzia aurantiaca*, *Boletus scaber* var. *aurantiacus*, *Leccinum aurantiacum* var. *leucopodium*, *Boletus aurantius* var. *leucopodius*, *Boletus leucopodius*, *Boletus aurantiacus*
- Chapeau:** 8-15cm, charnu, d'abord hémisphérique puis convexe, à surface irrégulière, à marge très peu enroulée devenant lisse à faiblement excédente et parfois légèrement ondulée, à cuticule finement feutrée, de couleur vive allant de l'orangé ou roux orangé ou parfois plus foncé
- Lamelles:** néant: tubes longs, d'abord de couleur blanchâtre puis devenant grisâtre à brunâtre
- Pied:** sans anneau, d'abord généralement trapu voire obèse mais pouvant être également cylindrique, puis s'allongeant et devenant légèrement renflé à la base, rugueux, blanchâtre à blanc grisâtre parsemé de squamules de couleur blanche devenant ensuite brun-rougeâtre puis noirâtre, bleu verdâtre à la base
- Chair:** blanche, devenant rosée-violacée puis noirâtre à la coupe, surtout à la jonction du pied et du chapeau, molle dans le chapeau, verdissant avec l'âge
- Odeur:** agréable, fongique
- Saveur:** douce
- Habitat:** juillet-octobre, bois de trembles, plus rarement sous d'autres feuillus, le plus souvent sur les sols argileux et dans les dépressions plus humides, les coupe-feux en creux et les abords des fossés, le plus souvent caché dans les zones herbeuses lorsqu'il fait sec
- Remarques:** plusieurs sous-espèces en fonction de leur habitat
- Confusion:** Bolet roux, Bolet roussissant (*Leccinum versipelle*)
Leccinum versipelle a un pied avec des verrues noires réparties uniformément alors que *Leccinum rufum* a des verrues oranges disposées en stries verticales
Bolet rude (*Leccinum scabrum*)
Cèpe des pins (*Boletus pinophilus*)
- Conservation:** Congélation: les vieux exemplaires ont tendance à devenir très mous, devient gluant si cuit - Séchage - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau non visqueux > Pied long et couvert de petites écailles > *Leccinum*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Boletaceae > *Leccinum*

Photos:



