

Polypore d'hiver



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Polyporus brumalis*


Famille: *A tubes > Polyporaceae > Polyporus*

Caractéristiques du genre *Polyporus* : chapeau: coriace, élastique, sec, feutré à écailleux - lames: tubes en couches minces - pied: central ou excentrique - remarques: lignicole, saprophyte, plus rarement parasite, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** *Lentinus brumalis*, *Polyporus subarcularius*, *Polyporus brumalis* f. *subarcularius*, *Favolus apiahynus*, *Polyporus queletianus*, *Microporus substriatus*, *Polyporus tucumanensis*, *Polyporus pauperculus*, *Leucoporus brumalis*, *Polystictus substriatus*, *Polyporellus brumalis*, *Polyporellus fuscidulus*, *Polyporus vernalis*, *Polyporus luridus*, *Polyporus trachypus*, *Polyporus nanus*, *Polyporus fuscidulus*, *Polyporus substriatus*, *Boletus ciliatus*, *Boletus brumalis* var. *fasciculatus*, *Boletus brumalis*, *Boletus fasciculatus*, *Boletus fuscidulus*, *Boletus hypocrateriformis*, *Polystictus brumalis*
- Chapeau:** 1-8cm, d'abord convexe puis plan avec centre légèrement déprimé, marge enroulée, puis excédentaire et lobée, se repliant sur elle même, concolore au reste du chapeau, cuticule séparable entièrement, fine, caoutchouteuse, brun-roux, brun-foncé, mate, veloutée
- Lamelles:** néant : tubes adnés à subdécurrents à petits pores, ronds mais allongés vers le pied, de couleur blanchâtre devenant crème vers la fin
- Pied:** sans anneau, cylindrique, parfois excentré, d'abord feutré puis devenant lisse, de couleur crème brunâtre devenant brunâtre à gris brunâtre
- Chair:** blanche, élastique, coriace
- Odeur:** faible, fongique
- Saveur:** douce
- Habitat:** octobre-mai, essentiellement sur les branches mortes dans les bois de feuillus, appréciant notamment les bouleaux ainsi que les hêtres, isolé ou en groupe
- Remarques:** la consistance trop coriace en fait un piètre comestible.
Sa taille varie beaucoup en fonction du substrat
- Confusion:** *Polypore cilié (Polyporus ciliatus)*
Polypore cilié dont les pores sont plus petites et le pied est chiné/zébré
Polypore écailleux (Polyporus squamosus)
Plus petit que le Polypore écailleux qui devenir énorme et ne pousse pas en hiver
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chaire dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied central et grêle > Chapeau écailleux > *Polyporus*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > *Lentinus*

Photos:







Photos micro:

