

Boviste des marais



Comestible, mais sans valeur

Nom latin: Bovista paludosa, bovistella paludosa

Famille: Autres > Lycoperdaceae > Bovista

Caractéristiques du genre Bovista : chapeau: souvent globuleux, se détachant facilement du mycélium à maturité, masse de spores rejetées par une ouverture au sommet, pédicule stérile, nul ou réduit, plus rarement bien développé - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte, terrestre, toutes les espèces sont comestibles jeunes, tant que l'intérieur est blanc, voir Scléroderma

- Chapeau:** 2-4 cm, d'abord blanc, surface lisse ou faiblement cloisonnée, brun couvert à brun-noir à maturité, globuleux ou avec tête et pédicule
- Lamelles:** néant
- Pied:** néant, pédicule stérile bien distinct
- Chair:** molle, blanche jeune, vert-olive à maturité
- Odeur:** neutre
- Saveur:** neutre
- Habitat:** juin-octobre, tourbières, terrain acide, en montagne. Très rare en plaine.
- Remarques:** identifiable à son habitat et sa surface lisse
- Confusion:** Vesse-de-loup perlée (Lycoperdon perlatum)
Le Boviste des marais et plus lisse et plus grand
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Avant maturité champignon sphérique, semi-enterré ou au ras du sol > Pas de couche interne gélatineuse, à maturité sphère laissant échapper un nuage de spores > Couche externe blanche, souple > Champignon sphérique, sans amorce de pied > Bovista

