

Fausse truffe à plis tortueux, truffe du porc à chair méandriforme



Toxique

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Choiromyces meandriformis*

Famille: Autres > Tuberaceae > Tuber

Caractéristiques du genre *Tuber* : chapeau: bulbeux, écorce lisse à verruqueuse, intérieur typiquement marbré, labyrinthiforme - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: mycorrhizien

Synonymes: -

Chapeau: 4-10 cm, enterré, aspect de "pomme de terre", irrégulièrement subglobuleux, blanc-gris, brun clair ou brun rougeâtre ou jaune-brun. Périidium d'abord mou puis coriace, lisse, bosselé, se durcissant au sec, se carquelant, blanc au début puis se tachant d'ocre à jaunâtre

Lamelles: néant

Pied: néant

Chair: dure, charnue, tenace, blanchâtre à blanc-grisâtre, marbrée, méandres sinueux, plus blanc au coeur de la masse

Odeur: désagréable, d'abord neutre, puis aromatique, de chlore

Saveur: désagréable

Habitat: juin-septembre, dans les bois de toutes sortes, principalement hêtraies-sapinières, sur sols argileux ou calcaires, rare

Remarques: hypogée comme les truffes, mais souvent on devine sa présence par ses fructifications affleurant et dépassant le niveau du sol. Les porcs en sont friands, d'où le nom de genre "Choiros" = pourceau

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Toxicité?: Syndrome: gastro-intestinal (= résinoïdien) - Poison: Chitine, tréhalose, mannitol, etc.

Considérée comme spécialité dans certains pays d'Europe du nord

Symptômes: Latence: 3-6 heures, puis nausées, des vomissements, des douleurs gastriques et des diarrhées.

Remarques: Ce syndrome provoque essentiellement des nausées, des vomissements, des douleurs gastriques et des diarrhées. Ce syndrome peut être provoqué par une multitude d'espèces de champignons et par diverses causes. Les champignons comestibles mangés en trop grandes quantités peuvent provoquer ce syndrome car les champignons contiennent des molécules peu digestes (chitine) et/ou uniques aux champignons (tréhalose, mannitol). Les personnes ayant un déficit en tréhalase (enzyme qui dégrade le tréhalose) peuvent avoir des diarrhées. Certaines espèces, dans certains cas, peuvent être toxiques: *Armillaria* sp., *Lepista* sp., *Agaricus xanthoderma* (Agaric jaunissant)

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Développement entièrement souterrain (Truffes) > Chair marbrée, en labyrinthe > Tuber

Classification: Fungi > Dikarya > Ascomycota > Pezizomycotina > Pezizomycetes > Pezizomycetidae > Pezizales > Tuberaceae > Choiromyces

Photos:



