

Pleurote en éventail, Panus en éventail



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Panus conchatus*

Famille: A lames > Tricholomataceae > Panellus

Caractéristiques du genre *Panellus* : chapeau: petit, chair mince, en forme de coquille avec couche gélatineuse - lames: adnées, trame régulière, blanches à ocre-brunâtre - pied: petit à minuscule, latéral - remarques: saprophyte sur bois mort ou parasite

Synonymes: *Lentinopanus conchatus*, *Pleurotus torulosus*, *Panus torulosus* var. *conchatus*, *Lentinus torulosus*, *Lentinus obconicus*, *Lentinus vaporarius*, *Pocillaria krombholzii*, *Pocillaria torulosa*, *Pocillaria vaporaria*, *Pocillaria conchata*, *Pocillaria divisa*, *Pocillaria percomis*, *Lentinus bresadolae*, *Lentinus divisus*, *Lentinus percomis*, *Panus vaporarius*, *Panus monticola*, *Panus torulosus*, *Lentinus inconstans*, *Agaricus conchatus* var. *inconstans*, *Agaricus conchatus* var. *torulosus*, *Pleuropus inconstans*, *Agaricus inconstans* var. *conchatus*, *Agaricus torulosus*, *Boletus cristatus* var. *floriformis*, *Agaricus inconstans*, *Agaricus conchatus*, *Panus carneotomentosus*

Chapeau: 4-10cm, largement convexe à conchoïde, vite étalé, déprimé à infundibuliforme, sec, subglabre à finement duveteux, lisse, souvent plissé radialement à craquelé en petites plaques avec l'âge, pourpré à brun pourpré au début, puis brun à tan et retenant du pourpré vers la marge, développant des zones concentriques de couleurs, à marge enroulée au début, puis relevée, irrégulièrement lobée ou souvent ondulée, aiguë

Lamelles: décurrentes, étroites, souvent fourchues près du pied, avec lamellules fréquentes, serrées à subespacées, blanchâtres à jaunâtre ou pourprées au frais et au début, puis brunâtre pâle, à arêtes entières

Pied: sans anneau, quasi inexistant, excentré à latéral, parfois centré, égal à légèrement atténué vers la base, robuste, tenace, plein, sec, couvert de fins poils au début, surtout vers la base, concolore au chapeau, tan pâle à blanc grisâtre, avec mycélium basal blanc à lilas

Chair: très tenace, blanchâtre, immuable, coriace

Odeur: agréable, rappelant le Pied bleu

Saveur: neutre, amère lorsque vieux

Habitat: juin-octobre, saprotrophe sur bois pourri de feuillus, souches et billes, agent de la pourriture blanche, solitaire, ou souvent grégaire à cespiteux ou en amas imbriqués

Remarques: Peu apprécié vu la coriacité de sa chair et sa tendance à devenir amer avec l'âge

Confusion: Pleurote en forme d'huître (*Pleurotus ostreatus*)
Couleur plus violette et plus coriace, amer avec l'âge

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied latéral ou excentrique > Chapeau lisse et pied latéral > Chapeau avec couche gélatineuse > Chapeau grand, lamelles décurrentes > *Panellus*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > *Lentinopanus*

Photos:

