

Polypore de Schweinitz, Phéole de Schweinitz



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Phaeolus spadiceus*

Famille: A tubes > Coriolaceae

Caractéristiques du genre Coriolaceae : chapeau: - lames: - pied: - remarques:

Synonymes: -

Chapeau: 15-25cm, circulaire, irrégulièrement lobé, dimidié, tomenteux à hirsute, noduleux-bosselé, légèrement zoné, orangé au début, brun jaunâtre à maturité, brun rougeâtre foncé au sec, à marge jaune soufre à vert-jaune au frais, brun-rouge à noire avec l'âge

Lamelles: tubes, face orangée au début, brun verdâtre et brun jaunâtre à brun rouille avec l'âge, pores anguleux à labyrinthiques, 1-2 par mm, irréguliers, couche de tubes décurrente, distincte du contexte, verdâtre à brun rouille, jusqu'à 1,5 mm de longueur

Pied: sans anneau, centré à latéral, court et trapu, parfois réduit à un tubercule, irrégulier à difforme, simple ou ramifié

Chair: humide à mouillée, tendre, mou-fibreux, brun jaunâtre au début, brun rouille foncé avec l'âge, apparaissant souvent zoné, jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur, brunit sous la pression du doigt du côté des pores. Friable, fragile en séchant et devenant très légère au sec

Odeur: humide

Saveur: nulle

Habitat: juillet-octobre, essentiellement sur débris ligneux, souches et branches pourrissantes de résineux dans les bois de conifères mais aussi dans les bois mixtes comportant des essences de mélèzes, pins et épicéas, parasite sur bois vivant surtout de conifères, poussant et continuant de décomposer les arbres morts, souches et billes; rarement de feuillus. Isolément ou en groupes de quelques rares individus, parfois imbriqués



Remarques: provoque une pourriture brune. Assez rare.

Confusion: Polypore soufré (*Laetiporus sulphureus*)
lorsque très jeune, car aussi jaune, mais pousse au pied des arbres et pas sur le tronc.

Classification: -

Photos:







Photos micro:

