

Polypore bai, polypore à pied noir, polypore à pied couleur de poix



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Polyporus badius*

Famille: *A tubes > Polyporaceae > Polyporus*

Caractéristiques du genre *Polyporus* : chapeau: coriace, élastique, sec, feutré à écailleux - lames: tubes en couches minces - pied: central ou excentrique - remarques: lignicole, saprophyte, plus rarement parasite, provoque une pourriture blanche

Synonymes: *Royoporus badius*, *Melanopus picipes*, *Leucoporus picipes*, *Polyporellus picipes*, *Polyporus dibaphus*, *Favulus trachypus*, *Polyporus picipes*, *Grifola badia*, *Boletus batschii*, *Boletus durus*

Chapeau: 4-20cm, 1-8 mm d'épaisseur, légèrement déprimé, turbiné, typiquement infundibuliforme à flabelliforme, suborbiculaire, réniforme à irrégulier, souvent convexe à la base, sec, lisse à marqueté radialement, glabre, lisse à rugueux au sec, luisant à mat, brun rougeâtre pâle et plus foncé au centre au début, vite brun rougeâtre à brun marron et brun noirâtre foncé au centre, à marge légèrement incurvée au début, relevée, souvent ondulée à lobée avec l'âge, aiguë, mince, plus pâle

Lamelles: sans lames, pores minuscules, ronds à anguleux, couche blanche, crème à chamois pâle au début, brunâtre avec l'âge. Couche de tubes décurrente, blanche au début, légèrement plus foncée que le contexte avec l'âge, 1-2 mm de longueur

Pied: sans anneau, centré ou excentré à latéral, subégal ou un peu courbe, atténué à la base ou court et cousiné, tenace, parfois creux, lisse, glabre et pâle vers l'apex, finement tomenteux et noir vers la base, souvent entièrement noir

Chair: peu épaisse et très fine au bord du chapeau, tenace, élastique, coriace, puis vieillissant en place devient dure et cassante, blanche puis brunâtre claire

Odeur: fongique

Saveur: neutre à amère

Habitat: mai-novembre, saprotrophe, sur bois mort de feuillus, parfois de conifères, agent de carie blanche, sur troncs pourrissant à terre, en bordure immédiate de rivières, lacs ou mares

Remarques: pas un champignon commun, lorsque les conditions sont réunies, le tronc sera parasité de nombreux carpophores sur toute sa longueur

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied central et grêle > Chapeau écailleux > *Polyporus*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > *Royoporus*

Photos:



