Tramète cinabre





Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



Nom latin: Pycnoporus cinnabarinus

Famille: A tubes > Coriolaceae

Caract?ristiques du genre Coriolaceae : chapeau: - lames: - pied: - remargues:

Synonymes: cinnabarinus, Coriolus cinnabarinus, Hapalopilus cinnabarinus,

> cinnabarinus, Leptoporus cinnabarinus, Polystictus cinnabarinus, Trametes cinnabarina, Trametes cinnabarinus, Polyporus cinnabarinus, Polyporus cinnabarrinus, Boletus cinnabarinus

7x15x4cm, dimidié à allongé, réniforme ou en forme de console à contour souvent irrégulier, à Chapeau:

> surface bosselée et à marge aigue, à cuticule veloutée à l'état juvénile, glabre, azoné, saumon ochracé à orange abricot, couleur orange très vive, presque fluo, puis plus pâle avec l'âge ou

noircissant

Lamelles: sans lames, tubes rouge orangé à rouge corail, rouge plus longtemps que le chapeau, pores

ronds à anguleux, 3-4 par mm, à dissépiments tomenteux, épais, puis parfois minces et lacérés,

couche de tubes orange rougeâtre à jaunâtre au sec, jusqu'à 6 mm de longueur

Pied: sans pied, sans anneau, en console

Chair: molle, fibreuse à subéreuse coriace en vieillissant, zoné, rouge à orange pâle, jusqu'à 1.5cm

d'épaisseur

Odeur: neutre, fongique

Saveur: neutre

juin-octobre, saprotrophe, généralement en petits groupes de quelques individus mais parfois Habitat:

aussi isolément, sur bois mort de feuillus, rarement de conifères, sur souches pourries et

carbonisées, agent de carie blanche

Remarques: Realtivement rare, ne peut être confondu vu sa couleur

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales >

Polyporaceae > Fabisporus

Photos:



