

# Lentin élégant, Lentin écailléux



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

*Nom latin: Neolentinus suffrutescens*

*Famille: A lames > Polyporaceae > Pleurotus*

*Caractéristiques du genre Pleurotus : chapeau: grand, charnu, sec, avec ou sans voile membraneux, cuticule sans couche gélatineuse - lames: adnées, trame irrégulière, blanchâtres, décurrentes - pied: généralement court, latéral - remarques: parasite et saprophyte, principalement sur bois, provoque une pourriture brune*

- Synonymes:** Neolentinus lepideus, Panus lepideus, Lentinus spretus, Lentinus platensis, Lentinus magnus, Pocillaria contigua, Pocillaria cryptarum, Pocillaria gallica, Pocillaria lepidea, Pocillaria monnardiana, Pocillaria queletii, Pocillaria sitanea, Pocillaria suffrutescens, Lentinus domesticus, Lentinus gallicus, Lentinus queletii, Lentinus maximus, Lentinus contiguus, Clitocybe lepidea, Lentinus cryptarum, Lentinus monnardianus, Lentinus sitaneus, Agaricus polymorphus var. tubaeformis, Lentinus lepideus, Lentinus suffrutescens, Agaricus lepideus, Agaricus suffrutescens, Agaricus cyprinus, Agaricus serpentiformis
- Chapeau:** 3-15cm, convexe à étalé, parfois déprimé, sec à viscidule, souvent avec écailles grossières brunâtres à foncées sur fond blanchâtre, à marge parfois perlée de gouttelettes au début, marge excédentaire, recouvrant les lames, concolore au reste du chapeau, cuticule sèche, blanche à ocre-pâle. Ecailles brunes, noircissantes, concentriques
- Lamelles:** décurrentes à uncinées, parfois adnées à sinuées, larges, avec lamellules, assez serrées, blanchâtres à chamois ou parfois jaunes, devenant souvent brunâtres au froissement, jaunâtres avec l'âge, à arêtes dentelées
- Pied:** anneau velu, coriace, élastique, robuste, central ou parfois excentré, atténué vers la base ou bulbeux, tenace, dur, plein, finement fibrilleux au-dessus de l'anneau, écaillé au-dessous, blanc à concolore au chapeau, devenant brun rougeâtre vers la base, avec écailles souvent brunâtres à brun rougeâtre avec l'âge, surface craquelée, fendue. Voile partiel membraneux, laissant un anneau supère ou apical sur le pied, parfois petit ou fugace avec l'âge
- Chair:** épaisse, tenace, caoutchouteuse, longtemps résistante à la décomposition, blanche puis souvent jaune avec l'âge ou au froissement
- Odeur:** distincte, fragrante ou forte, d'anis ou de baume du Perou, de fruits trop murs, aromatique
- Saveur:** douce à légèrement désagréable
- Habitat:** mai-octobre, solitaire, dispersé ou grégaire, saprotrophe sur bois peu décomposé, parfois sur bois d'œuvre, surtout piquets de clôture, dormants de chemins de fer, agent de carie brune, principalement sur conifères
- Remarques:** Principalement les années très sèches et chaudes, pour certains auteurs bon comestible au début lorsque la chair est tendre
- Confusion:** Lentin collant (*Neolentinus adhaerens*)  
*écailles et pied*  
Pholiote destructrice, Pholiote des peupliers (*Pholiota populnea*)  
*Pousse sur résineux, goût pas amer, sporée blanche*
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied latéral ou excentrique > Chapeau lisse et pied latéral > Chapeau sans couche gélatineuse
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Gloeophyllales > Gloeophyllaceae > Neolentinus

## Photos:



