## Vesse-de-loup à diaphragme, Vesse-de-Loup des Prés





## Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



Nom latin: Lycoperdon pratense

Famille: Autres > Lycoperdaceae > Lycoperdon

Caract?ristiques du genre Lycoperdon: chapeau: piriforme, brunissant peu à peu à maturité, intérieur de la tête se transformant en masse de spore qui s'échappent quand une ouveture se déchire au sommet - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte, terrestre, rarement sur bois mort, voir Calvatia

Synonymes: Vascellum pratense, Calvatia depressa, Vascellum depressum, Bovista queletii, Globaria

queletii, Utraria pratensis, Lycoperdon depressum, Lycoperdon hyemale

Chapeau: 3-6cm, blanc à blanc crème, trapu, globuleux, turbiné, le plus souvent aplati tronqué au

sommet, en poire atténuée, court de pied, granuleux à finement hérissé jeune, mais vite dénudé, ouverture à maturité en partie supérieure par un pore déchiqueté qui s'élargit ensuite et à la dispersion totale des spores, ne restera en place, parfois quelques mois durant, un

réceptacle formé d'une coupe

Lamelles: sans lame

Pied: sans anneau, sans pied distinct si ce n'est une sorte de prolongement conique du carpophore

aboutissant à un rhizomorphe se désolidarisant facilement du sol

Chair: partie fertile interne blanche (gléba) puis brune, enfin pulvérulente, partie sous le diaphragme,

stérile (subgléba), lacuneuse, blanche puis brune

Odeur: nulle à très faiblement farineuse à l'état juvénile

Saveur: neutre

Habitat: juin-septembre, uniquement dans les zones herbeuses telles prairies, clairières, parcs

découverts et pelouses, en petits groupes de quelques individus disséminés

**Remarques:** petit frère du Lycoperdon géant, chair moin goûtue et fine.

**Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air

libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Avant maturité champignon sphérique, semi-enterré ou au ras du sol > Pas de couche interne gélatineuse, à maturité sphère laissant échapper un nuage de spores > Couche externe blanche, souple > Champignon en forme de poire > Surface externe couverte de verrues ou aiguillons caducs >

Lycoperdon

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >

Agaricales > Agaricaceae > Vascellum

## Photos:

















