

Pleurote styptique



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Panellus stipticus*

Famille: *A lames > Tricholomataceae > Panellus*

Caractéristiques du genre *Panellus* : chapeau: petit, chair mince, en forme de coquille avec couche gélatineuse - lames: adnées, trame régulière, blanches à ocre-brunâtre - pied: petit à minuscule, latéral - remarques: saprophyte sur bois mort ou parasite

- Synonymes:** *Panellus stipticus* var. *farinaceus*, *Lentinus farinaceus*, *Pocillaria stiptica*, *Lentinus stipticus*, *Panus stipticus* var. *farinaceus*, *Panellus farinaceus*, *Panellus stipticus*, *Pleurotus stipticus*, *Panus farinaceus*, *Panus stipticus*, *Rhipidium stipticum*, *Crepidopus stipticus*, *Crepidopus stipticus*, *Agaricus farinaceus*, *Agaricus stipticus*, *Agaricus stipticus*, *Merulius stipticus*
- Chapeau:** 1-4cm, semi-circulaire, spatulé, linguiforme à réniforme, convexe, aplati et parfois déprimé à la base, mat, sec à collant, finement fibrilleux-furfuracé à rugueux-écailleux, aréolé, sillonné radialement vers le pourtour, parfois légèrement zoné, beige, brunâtre à ocre chamois, dans divers tons de brun à tan au sec, à marge enroulée au début, puis ondulée et légèrement crénelée
- Lamelles:** adnées à décurrentes, radiantes et abruptement délimitées du pied, étroites, certaines fourchues, 40-70 atteignant le pied, avec 3-7 lamellules entre chaque paire de lames, serrées, beiges, chamois rosâtre à brun rosâtre
- Pied:** rudimentaire; latéral ou excentré, souvent atténué et légèrement comprimé vers la base, souvent congrescent à d'autres, plein, élastique, finement fibrilleux à finement furfuracé-squamuleux, concolore au chapeau ou plus pâle à presque blanchâtre
- Chair:** mince, élastique, molle à tenace, blanche, crème à chamois pale
- Odeur:** indistincte ou fruitée-aromatique
- Saveur:** poivrée à âcre-astringente après assez longue mastication
- Habitat:** juillet-décembre, souvent grégaire ou en amas imbriqués, plus rarement solitaire, saprotrophe, sur bois mort de feuillus
- Remarques:** Certaines variantes sont luminescentes, notamment chez les spécimens américains
- Confusion:** *Crépidote mou* (*Crepidotus mollis*)
Pleurotus: sporée blanche avec pied, Crepidotus: sporée brune pas de pied.
Pleurote en forme d'huître (*Pleurotus ostreatus*)
couleur, saveur
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied latéral ou excentrique > Chapeau lisse et pied latéral > Chapeau avec couche gélatineuse > Chapeau grand, lamelles décurrentes > *Panellus*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Mycenaceae > *Panellus* > *Panellus stipticus*

Photos:







Photos micro:

