

Bolet roux, Bolet roussissant



Bon comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: Leccinum versipelle

Famille: A tubes > Boletaceae > Leccinum

Caractéristiques du genre Leccinum : chapeau: sec, mat à velouté, tout au plus un peu collant avec l'âge - lames: tubes facilement séparables, ventrus sur les vieux exemplaires - pied: généralement assez mince, réticulé - remarques: mycorrhizien

- Synonymes:** Leccinum callitrichum, Leccinum cerinum, Leccinum percandidum, Leccinum rufescens, Krombholziella versipellis, Krombholziella roseotincta, Krombholziella rufescens, Boletus percandidus, Leccinum roseotinctum, Krombholzia aurantiaca f. rufescens, Krombholzia rufescens f. percandida, Leccinum testaceoscabrum, Trachypus rufescens, Krombholzia rufescens, Boletus rufescens, Boletus versipellis
- Chapeau:** 7-15cm, hémisphérique devenant convexe étalé, à marge excédente et parfois légèrement ondulée, à cuticule veloutée par temps sec et visqueuse à l'humidité, de couleur terne allant du jaune orangé à orange ou roux, parfois brun orangé
- Lamelles:** tubes fins, de couleur blanche devenant ensuite blanchâtre à crème puis ocre jaunâtre, et parfois plus foncés encore, en vieillissant
- Pied:** sans anneau, généralement moins massif que les autres bolets mais ferme et souvent plus épais à la base, couvert de petites mèches granuleuses grisâtres devenant noires, vert bleuâtre à la base
- Chair:** blanche virant au noirâtre en passant par le rosâtre puis rouge violacé, base du stipe souvent bleue verdâtre
- Odeur:** neutre
- Saveur:** douce
- Habitat:** septembre-novembre, plutôt montagnard associé par mycorhizes aux bouleaux (Betula) parmi les bruyères, en terrain léger et à tendance acide
- Remarques:** Très proche du bolet orangé, il ne s'en différencie pratiquement que par la couleur des mèches ornant le pied et un chapeau généralement plus clair
- Confusion:** Bolet orangé (Leccinum aurantiacum)
Leccinum versipelle a un pied avec des verrues noires réparties uniformément alors que Leccinum rufum a des verrues oranges disposées en stries verticales
- Conservation:** Séchage - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau non visqueux > Pied long et couvert de petites écailles > Leccinum
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Boletaceae > Leccinum

Photos:



