

Oreille de lièvre



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Otidea leporina

Famille: Autres > Pezizaceae > Otidaceae

Caractéristiques du genre Otidaceae : chapeau: auriculé, en gobet ou en coupe, fendu d'un côté, base brièvement pédonculée, couche fertile sur la face interne - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte, terrestre

Synonymes: Otidea fuckelii, Otidea crassa, Helvella leporina, Otidea myosotis, Otidea leporina var. rubescens, Scodellina auricula, Otidea auricula, Otidea leporina var. minor, Wynnella auricula, Otidea leporina f. major, Otidea leporina f. minor, Scodellina leporina, Peziza leporina, Elvela auricula

Chapeau: 2-4cm, rièvement stipité, dressé, fendu d'un côté, en forme d'oreille, lisse et brun à l'intérieur, avec parfois une teinte un peu vineuse ou purpurine, grisâtre, alutacé ou roussâtre et farineux à l'extérieur, uni et vilieux à la base

Lamelles: sans lames

Pied: sans anneau, blanchâtre, court, atténué à la base, duveteux, arrivant d'un mycélium relié à la litière

Chair: mince, brune, fragile

Odeur: indistincte

Saveur: indistincte

Habitat: septembre-octobre, dans la terre, parmi les aiguilles ou la mousse, dans les bois surtout en montagne, sous épicéa. Grégaire (surtout en petites touffes). Assez rare

Remarques: le type de forêt le sépare de son cousin qui pousse dans les feuillus

Confusion: Oreille de lièvre, Oreille d'âne (Otidea onotica)
Leporina: résineux, Onotica: feuillus

Classification: Fungi > Dikarya > Ascomycota > Pezizomycotina > Pezizomycetes > Pezizomycetidae > Pezizales > Pyronemataceae > Otidea

Photos:

