

# Clitocybe à bonne odeur



**Toxique**

Recommandation officielle:  **TOXIQUE**

Nom latin: *Paralepistopsis amoenolens*

Famille: *A lames > Tricholomataceae > Clitocybe*

Caractéristiques du genre *Clitocybe* : chapeau: diamètre variabil, souvent en entonnoir, év. mamelonné, sec, hygrophane ou non - lames: adnées, trame régulière, adhérentes à nettement décurrentes - pied: épais à mince, sans anneau - remarques: saprophyte, terrestre, certaines espèces renferment des neurotoxines

**Synonymes:** -

**Chapeau:** 4-7cm, d'abord hémisphérique, puis convexe à plan-convexe, enfin largement déprimé, mais jamais creusé en entonnoir, à marge longtemps enroulée, courtement cannelée par l'empreinte des lames, non hygrophane. Revêtement Brun, Crème, Jaune, légèrement visqueux par temps humide, mat-givré chez les jeunes puis finement dissocié en écailles plus ou moins redressées, roussissantes depuis l'extrémité jaune-ocre clair à brun jaunâtre, puis roussissant fortement à partir du centre, parfois brun rougeâtre dans la vieillesse, presque toujours tachés de guttules plus sombre vers le centre, la marge longtemps givrée-pruineuse

**Lamelles:** crème, moyennement serrées, avec lamellules, larges de 2-3 mm, décurrentes, nettement délimitées en haut du stipe, séparables quelques heures après la récolte mais pas sur le frais, crème blanchâtre puis ochracé pâle, concolores au chapeau chez les jeunes, arête entière, concolore

**Pied:** sans anneau, subcylindrique, parfois atténué en haut ou en bas, ou un peu renflé à la base, finement pruineux au sommet, crème ochracé, taché de roussâtre à la fin; base profondément enfouie dans la litière, à mycélium blanc, cotonneux, dense, agglomérant les aiguilles

**Chair:** assez épaisse et un peu élastique dans le chapeau, fibreuse dans le pied, crème jaunâtre pâle à isabelle

**Odeur:** forte, aromatique, agréable, irinée, de racine de corydale, de seringat, jasmin ou fleur d'oranger, rappelant *Tricholoma caligatum* ou *Inocybe bongardi*, éc?urante à la longue

**Saveur:** fongique-subfarineuse, aprescente sur le tard

**Habitat:** août-octobre, températures chaudes, résineux, typiquement sapin, épicéa ou mélèze

**Remarques:** cette espèce est nouvelle en Suisse, on la trouve principalement en Valais pour le moment (état: 2021). C'est un redouté toxique, raison pour laquelle ses sosies ont été supprimés de la liste des consommables.

**Confusion:** *Clitocybe inversé*, *Clitocybe flasque*, *Lépiste chamois* (*Lepista flaccida*)  
*odeur*

**Toxicité:** Syndrôme: acromélique - Poison: Acide acromélique

*Attention aux confusions avec les Clitocybes comestibles*

Symptômes: Latence: 1 à 7 jours, épisodes répétitifs (environ 30 minutes) de rougeurs cutanées avec sensations de brûlures, douleurs dans les mains et les pieds. Durée: de quelques semaines à 6 mois

Remarques: Ce syndrome est apparu avec l'espèce *Clitocybe Paralepistopsis amoenolens*, nouvellement apparue en Suisse à la fin des années 2010.

**Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles décurrentes > Sans anneau > Pied grêle ou en massue > Lamelles non bifurquées > Odeur d'amande amère ou anis > *Clitocybe*

**Classification:** -