

Exidie noirâtre



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Exidia nigricans*

Famille: Autres > Tremellaceae > Exidia

Caractéristiques du genre *Exidia* : chapeau: masse irrégulière, variable, gélatineuse, se rétrécissant et devenant cornée et séchant, couche fertile avec verrues d'aspect glanduleux - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche

Synonymes: *Exidia plana*

Chapeau: 1-1.5cm, pulviné, glanduleux, vésiculeux à lobé-ondulé et presque incolore au début, puis souvent étalé, cérébriforme, fusionnant en masse irrégulière extensive plissée ou lobée, souvent jusqu'à 50 cm de longueur, sessile, gélatinisé, à face externe lisse à légèrement rugueuse, translucide, luisante au frais ou mate,

Lamelles: sans lames

Pied: sans anneau, sans pied

Chair: gélatineuse, molle, parfois transparente, se rétrécit sèche et racornit au sec

Odeur: nulle

Saveur: nulle

Habitat: janvier-décembre, grégaire ou en rangée et souvent confluent, saprotrophe, sur bois vivant ou mort de feuillus, branches au sol et découpes des troncs, plus rarement blessures d'arbres vivants

Remarques: composé de nombreux petits carpophores s'imbriquant pour former une couche épaisse de 5 à 15 mm., longue jusqu'à 10 - 20 cm ou plus jusqu'à pouvoir recouvrir toute la longueur d'une branche. Aussi appelé Beurre de sorcière

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair molle, irrégulière, presque gluante > Chair non jaune > *Exidia*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae > Auriculariales > Exidiaceae > *Exidia*

Photos:

