

Réticulaire vesse-de-loup



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Reticularia lycoperdon

Famille: Autres > Reticulariaceae > Lycogala

Caractéristiques du genre Lycogala: chapeau: en forme de petites boules de couleur - lames: inexistant - pied: inexistant - remarques: saprophyte

Synonymes: Enteridium lycoperdon, Fuligo lycoperdon

Chapeau: 2-8cm ou plus, irrégulièrement pulviné ou parfois globuleux à allongé, blanc argenté puis brunâtre, couvert de petites aspérités inégales puis bosselé à sublisse, lisse sur la surface interne

Lamelles: néant

Pied: néant

Chair: Cortex épais, dur, lisse, puis brun et poudreux

Odeur: neutre

Saveur: neutre

Habitat: mai-octobre, souches moussues et bois mort de feuillus

Remarques: Ce champignon n'en est plus un, il est classé aujourd'hui parmi les protistes

Confusion: Daldinie concentrique (*Daldinia concentrica*)
consistance
Vesse-de-loup molle (*Lycoperdon molle*)
habitat

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Petites masses hémisphériques de 0.5 à 1 cm, en général sur bois > Masses molles, rouge orangé, durcissant avec l'âge > Lycogala

Classification: Protozoa > Myxomycota > Myxomycetes > Liceales > Reticulariaceae > Enteridium

Photos:

