

Polypore du sapin



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Trichaptum abietinum*

Famille: *A tubes > Coriolaceae > Trichaptum*

Caractéristiques du genre *Trichaptum* : chapeau: chair très mince, coriace, chair composée de 2 couches - lames: tubes teintés surtout de violet à rose-lila - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** *Trametes abietina*, *Hirschioporus abietinus*, *Polystictoides abietinus*, *Microporus abietinus*, *Microporus pusio*, *Hansenia abietina*, *Poria caesia* alba, *Poria favillacea*, *Coriolus abietinus*, *Polystictus abietinus*, *Poria dentipora*, *Physisporus caesia* albus, *Bjerkandera abietina*, *Polyporus favillaceus*, *Polyporus parvulus*, *Polyporus dentiporus*, *Polyporus abietinus*, *Boletus purpurascens*, *Boletus abietinus*
- Chapeau:** 1-6 cm en forme d'huître ou de rein, dimidié, semi-circulaire, pétaloïde à flabelliforme, plat, légèrement convexe à campanulé, surtout vers la marge, mince, tomenteux, strigieux-feutré à hirsute, satiné à glabre avec l'âge, lisse, bosselé à légèrement raboteux à la base, avec zones concentriques de texture et de couleur beige, brun jaunâtre et brun grisâtre sur fond blanc, gris blanchâtre, gris à brunâtre, parfois verdâtre par les algues, à marge mince, aiguë, droite, sinueuse à légèrement lobée, recroquevillée inégalement sur elle-même au sec, légèrement fertile à stérile au-dessous, concolore à légèrement plus claire, blanchissant avec l'âge
- Lamelles:** sans lame, face poroïde réticulée-porée au début, rugueuse, graduellement labyrinthique puis irpicoïde, souvent luisante et violette à pourpre en croissance active, surtout vers la marge, immuable au froissement, puis lilas, brunâtre à ochracée, pores anguleux à dédaloides, serrés, à dissépinements épais et entiers au début, puis très inégaux, minces et souvent lacérés en dents avec l'âge ou sur les zones non pilées, couche de tubes ou dents continues et concolores au contexte inférieur, avec zone gélatinisée présente entre contexte et la couche de tubes
- Pied:** sans anneau, sans pied
- Chair:** blanc à gris, parfois gris-brun, couche supérieure floconneuse et molle, blanchâtre, couche inférieure ferme et tenace-fibreuse, blanche
- Odeur:** faible
- Saveur:** douce
- Habitat:** mai-octobre, souvent en groupe de multiples chapeaux imbriqués ou souvent soudés latéralement, un nouveau spécimen se développant parfois sur un vieux verdi de l'année précédente, saprotrophe sur sapin, aussi mélèze, rarement feuillus, sur souches, branches ou troncs tombés ou debout, agent de carie blanche
- Remarques:** se reconnaît à sa face fertile labyrinthique et la couleur violette à pourpre des pores
- Confusion:** *Tramète pubescente* (*Trametes pubescens*)
Tramète: pores crème, *Polypore*: pores violets
Tramète versicolore, *Polypore versicolore*, polypore de couleur variable (*Trametes versicolor*)
Tramète: pores crème, *Polypore*: pores violets
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied latéral ou nul > Chair mince ou dure comme du bois > Tubes violets > *Trichaptum*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > *Trichaptum*

Photos:



