

Fistuline hépatique, langue de boeuf



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: Fistulina hepatica

Famille: A tubes > Polyporaceae > Polyporus

Caractéristiques du genre Polyporus : chapeau: coriace, élastique, sec, feutré à écailleux - lames: tubes en couches minces - pied: central ou excentrique - remarques: lignicole, saprophyte, plus rarement parasite, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** *Fistulina hepatica* var. *endoxantha*, *Fistulina endoxantha*, *Buglossus quercinis*, *Hypodrys hepaticus*, *Fistulina sarcoides*, *Thelephora bucreas*, *Agarico-carnis lingua-bovis*, *Boletus bulliardii*, *Boletus esculentus*, *Boletus hepaticus*, *Boletus buglossum*
- Chapeau:** 10-30cm, sessile, irrégulier, dimidié, réniforme, semi-circulaire, flabelliforme à linguiforme, charnu au début, humide et collant au frais, finement bosselé, ± strié radialement, glabre, rouge sang, brun rougeâtre, orange rougeâtre à couleur de foie, plus terne avec l'âge, à marge arrondie à plutôt aiguë, ondulée à lobée, concolore
- Lamelles:** sans lames, face poroïde blanche à rosâtre pâle au début, puis jaunâtre et éventuellement brun rougeâtre avec l'âge, devenant brune au froissement. Pores ronds, 4-6 par mm environ. Couche de tubes décourante, blanchâtre, chamois pâle à jaune terne au frais, devenant brun rougeâtre foncé au froissement, brun pâle au sec, à tubes individuels très serrés, distinctement détachables, 1-1,5 cm de longueur
- Pied:** sans anneau, absent ou rudimentaire, typiquement latéral, court, simple ou ramifié, ferme, pelliculeux, concolore au chapeau au-dessus, brun noirâtre vers la base, blanchâtre au-dessous et couvert de pores, jusqu'à 5 cm de longueur, 3 cm de diam., parfois comme base élargie, simplement massuée et atténuée, jusqu'à 8 cm de diam. chez les basidiomes presque sessiles
- Chair:** épais, mou et aqueux au frais, blanchâtre, marbré, avec zones striées de rougeâtre, exsudant un liquide rougeâtre à la pression, jusqu'à 5 cm d'épaisseur
- Odeur:** neutre
- Saveur:** douce, acidulée, parfois un peu amère
- Habitat:** août-octobre, isolée, saprotrophe et parfois faiblement parasite sur bois vivant et mort de chênes et autres feuillus, près de la base des arbres et sur les souches
- Remarques:** comestible lorsque jeune, agent de carie brune, ressemble à un morceau de viande rouge accroché à un arbre ou à une souche
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chaire dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied central et grêle > Chapeau écailleux > Polyporus
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Fistulinaceae > *Fistulina* > *Fistulina hepatica*