

Pleurote petit nid



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Phyllotopsis nidulans*

Famille: A lames > *Tapinellaceae* > *Tapinella*

Caractéristiques du genre *Tapinella*: chapeau: flabelliforme, conchoïde, convexe ou déprimé, feutré à velouté, souvent glabrescent, dans les tons de beige, brun olivâtre, brun ocré, brun orangé à cannelle, à marge enroulée au début - lames: décurrentes ou radiantes d'un point d'attache, serrées, fourchues, anastomosées près du pied, détachables de la chair, pâles, jaunâtres puis jaune-brun, brunes à la fin - pied: centré, excentré latéral, absent ou rudimentaire, velouté et brun foncé à noirâtre lorsque distinct - remarques: chair blanchâtre, crème à jaunâtre, odeur indistincte

- Synonymes:** *Panus nidulans*, *Dendrosarcus nidulans*, *Pocillaria foetens*, *Agaricus odorativus*, *Crepidotus jonquilla*, *Claudopus nidulans*, *Crepidotus nidulans*, *Pleurotus nidulans*, *Agaricus jonquilla*, *Panus foetens*, *Agaricus nidulans*, *Dendrosarcus mollis*
- Chapeau:** 2-7cm, flabelliforme, conchoïde, semi-circulaire, réniforme à linguiforme, souvent attaché latéralement ou par le pied, largement convexe à étalé, couvert d'un tomentum feutré blanc à chamois au début, sec, jaune orangé à chamois orangé à l'humidité, orangé brunâtre à jaune ocre au sec, à marge longtemps enroulée, irrégulièrement ondulée, tomenteuse-villeuse
- Lamelles:** radialement excentrées à partir d'un point d'attachement, étroites à larges, avec lamellules, serrées, chamois orangé, jaune orangé à jaune rouille
- Pied:** sans anneau, sans pied ou rudimentaire, souvent tomenteux-strigieux blanc à la base
- Chair:** mince, tenace, élastique, jaunâtre
- Odeur:** typiquement forte, désagréable, de chou pourri ou de gaz d'éclairage, parfois douce
- Saveur:** saveur désagréable, amère, parfois douce ou fongique
- Habitat:** juin-novembre, grégaire ou en amas imbriqués, rarement solitaire, saprotrophe, sur bois pourrissant de feuillus, souvent en très grand nombre sur un même tronc
- Remarques:** reconnaissable à son odeur et sa saveur désagréables
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > En forme de moule, pied latéral réduit > Marge enroulée > *Tapinella*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Phyllotopsidaceae > *Phyllotopsis*

Photos:

