## Crépidote variable







Nom latin: Crepidotus variabilis

Famille: A lames > Crepidotaceae > Crepidotus

Caract?ristiques du genre Crepidotus : chapeau: en forme de moule, assez petit, cuticule sèche, rarement gélatineuse - lames: adnées, trame régulière, brunâtre à maturité - pied: mince - remarques: saprophyte sur bois mort

Synonymes: Derminus sessilis, Claudopus variabilis, Crepidopus variabilis, Agaricus variabilis

Chapeau: 1-3cm, en forme de coquille parfois irrégulière à marge très légèrement enroulée ou sinueuse et

ondulée, de couleur blanche

Lamelles: rayonnantes à partir du point d'attache, fines et espacées, de couleur blanche à crème

rosissant puis brunissant en vieillissant

Pied: sans anneau, sans pied

Chair: blanche, mince

Odeur: neutre

Saveur: douce à légèrement astreingeante

Habitat: août-décembre, bois, brindilles de bois mort, fagots et broussailles sur le sol, parfois aussi sur

tiges de plantes herbacées

**Remarques:** fréquente en tous lieux en Suisse romande

**Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

**Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,

du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun

ou rouille > En forme de moule, pied latéral réduit > Marge droite > Crepidotus

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >

Agaricales > Strophariaceae > Derminus

## Photos:





## Photos micro:



