

Stérée pourpre



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Chondrostereum purpureum*

Famille: Autres > Stereaceae > Stereum

Caractéristiques du genre *Stereum* : chapeau: recouvrant généralement le substrat par ses chapeaux superposés, ondulés, lobés, couche fertile lisse, sans aiguillons ou plis sur la face inférieure du chapeau, chair coriace-élastique - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte et parasite de faiblesse sur le bois, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** *Stereum nipponicum*, *Stereum ardoisiacum*, *Phylacteria micheneri*, *Stereum argentinum*, *Terana nyssae*, *Stereum lilacinum* var. *vorticolum*, *Stereum spgazzinianum*, *Stereum atrozonatum*, *Stereum pergamenum*, *Corticium nyssae*, *Stereum micheneri*, *Stereum rugosiusculum*, *Stereum vorticolum*, *Thelephora vorticosa*, *Stereum purpureum*
- Chapeau:** 1-3cm, sessile lorsque présent, ondulé, souvent en amas imbriqués de 10-50 cm de longueur, parfois crépu ou lobé, poilu, hirsute-tomenteux, glabrescent, indistinctement zoné, brun foncé, ocre chamois pâle, chamois cannelle, chamois jaunâtre, grisâtre à gris blanchâtre, à marge distinctement délimitée à légèrement frangée, aiguë, souvent nettement plus pâle
- Lamelles:** sans lames, hyménophore lisse, tuberculé-ondulé à légèrement plissé, finement poudreux, d'apparence cireuse, violacé foncé, pourpré à brun-violacé, violet-rose, chamois vineux foncé au frais et à l'humidité, plus pâle au sec
- Pied:** sans anneau, sans pied
- Chair:** tenace à coriace au frais, cassante au sec, avec ligne foncée à noire visible à la coupe, séparant le contexte et le tomentum piléique
- Odeur:** indistincte
- Saveur:** douce
- Habitat:** janvier-décembre, saprotrophe ou parasite, sur bois de feuillus, rarement de conifères, branches, troncs, souches, billes et pulpe, agent de carie blanche
- Remarques:** pousse toujours en groupes importants, se reconnaît à sa couleur rosée
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair solide, dure > Plus ou moins décollé du support, non rouge > *Stereum*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Cyphellaceae > *Chondrostereum*

Photos microscopie:

