

Lentin collant



Comestible, sans valeur



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Neolentinus adhaerens*

Famille: *A lames > Polyporaceae > Pleurotus*

Caractéristiques du genre *Pleurotus* : chapeau: grand, charnu, sec, avec ou sans voile membraneux, cuticule sans couche gélatineuse - lames: adnées, trame irrégulière, blanchâtres, décurrentes - pied: généralement court, latéral - remarques: parasite et saprophyte, principalement sur bois, provoque une pourriture brune

Synonymes: *Panus adhaerens*, *Lentinus adhaerens* f. *pulverulentus*, *Pocillaria adhaerens*, *Pocillaria adhaesa*, *Pocillaria hornotina*, *Pocillaria pulverulenta*, *Pocillaria resinacea*, *Lentinus adhaesus*, *Clitocybe adhaerens*, *Lentinus pulverulentus* var. *resinaceus*, *Lentinus adhaerens*, *Lentinus hornotinus*, *Lentinus pulverulentus*, *Lentinus resinaceus*, *Agaricus resinaceus*, *Agaricus adhaerens*, *Agaricus pulverulentus*

Chapeau: 2-6cm, convexe puis convexe-ombonné, étalé et déprimé, coriace, sec au début, parfois collant avec l'âge, visqueux par endroits, finement écailleux et beige au début, progressivement couvert d'une résine ambrée qui fonce et durcit avec l'âge, d'aspect laqué, laissant des plaques luisantes brun rougeâtre, à marge enroulée et légèrement plissée au début

Lamelles: subdécurrentes, modérément larges à larges, parfois anastomosées près du pied, 16-19 atteignant le pied, avec lamellules fréquentes, subespacées, blanchâtres à crème, puis brunâtres, parfois tachées de brun rougeâtre, à arêtes entières ou ondulées à distinctement crénelées-serrulées, lisses ou avec flocons brunâtres inégaux avec l'âge, blanchâtres

Pied: sans anneau, centré à excentré, subégal à clavé vers la base, légèrement radicant, souvent courbe, tomenteux-hirsute vers l'apex, glabre vers la base, jaune-brun pâle ou concolore au chapeau, parfois taché de brun rougeâtre, devenant gris-brun foncé à la base

Chair: ferme, tenace, blanchâtre, beige à jaune-brun pâle

Odeur: odeur agréable, fongique et de résine

Saveur: douce puis lentement âcre ou astringente

Habitat: octobre-mars, solitaire, subgrégaire ou cespiteux, saprotrophe, sur bois mort de conifères et de feuillus, troncs, souches, branches et racines surtout de sapins


Remarques: responsable de la carie brune des arbres

Confusion: *Lentin élégant*, *Lentin écailleux* (*Neolentinus suffrutescens*)
écailles et pied


Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied latéral ou excentrique > Chapeau lisse et pied latéral > Chapeau sans couche gélatineuse

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Gloeophyllales > Gloeophyllaceae > *Neolentinus*

Photos:



Photos loupe:



Photos micro:

