


Clavaire crêtée



Image pas disponible



Comestible, sans valeur



NON COMESTIBLE

Nom latin: Clavulina cristata

Famille: Autres > Clavulinaceae > Clavulina

Caractéristiques du genre Clavulina : chapeau: claviforme à coralloforme, blanchâtre à gris, chair blanchâtre, cassante - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur terre ou bois, voir Ramaria

- Synonymes:** Clavulina coralloides f. cristata, Stichoramaria cristata, Clavaria cristata, Ramaria cristata
- Chapeau:** 5-10cm, buisson formé de rameaux courts, aplatis et découpés en petites crêtes en leur extrémité, de couleur blanche devenant grisâtre en vieillissant
- Lamelles:** néant
- Pied:** sans anneau, épais et court
- Chair:** blanchâtre, flexible, assez coriace surtout dans le pied
- Odeur:** nulle
- Saveur:** douce
- Habitat:** septembre-décembre, isolée ou en troupe de nombreux individus, dans les forêts ombragées de feuillus mais le plus souvent sous conifères ou mixte
- Remarques:** Parmi les plus communes de la famille, elle passe souvent inaperçue car dissimulée sous les feuilles mortes, reconnaissable aux extrémités de ses rameaux aplatis
- Confusion:** Clavaire cendrée (Clavulina cinerea)
couleur
- Détermination:** Carpophage > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chair non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair fragile ferme et cassante > Pied moyen à épais > Tronc ramifié > Rameaux à section circulaire > Moins de 5-6 cm, tronc blanc, peu ramifié > Clavulina
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Cantharellales > Hydnceae > Clavulina > Clavulina coralloides

Photos microscopie:

