

Lentin ours



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Lentinellus ursinus*

Famille: A lames > Polyporaceae > Pleurotus

Caractéristiques du genre *Pleurotus* : chapeau: grand, charnu, sec, avec ou sans voile membraneux, cuticule sans couche gélatineuse - lames: adnées, trame irrégulière, blanchâtres, décourrentes - pied: généralement court, latéral - remarques: parasite et saprophyte, principalement sur bois, provoque une pourriture brune

Synonymes: *Lentinellus castoreus* var. *hispidus*, *Lentinellus ursinus* f. *luxurians*, *Lentinus vulpinus* f. *ursinus*, *Panellus ursinus*, *Resupinatus ursinus*, *Pocillaria pelliculosa*, *Pocillaria ursina*, *Hemicybe ursina*, *Lentinus pelliculosus*, *Lentinus ursinus*, *Agaricus pelliculosus*, *Agaricus ursinus*

Chapeau: 2-6cm, irrégulièrement conchoïde, réniforme à presque semi-circulaire, convexe à subétalé, souvent déprimé au centre ou vers le point d'attache, sec, souvent hygrophane, sublisce, devenant ridé ou finement ruguleux radialement vers la marge, couvert d'un tomentum velouté ou densément hispide brun foncé à brun noirâtre, surtout au point d'attache avec l'âge, lisse sur les chapeaux du dessous des amas imbriqués, sur fond beige, brun olive, brun roux à ambre, plus pâle vers la marge, finement taché ou plaqué de brun foncé à cannelle, entièrement chamois fauve au sec, à marge enroulée à incurvée et souvent appendiculée au début, puis subétalée, entière à lobée

Lamelles: radiantes à partir d'un point d'attache, souvent décourrentes lorsque la base est large, adnées à adnexées, larges, jusqu'à 5 mm, subespacées à modérément serrées, blanchâtres, à brun rosâtre, parfois avec petites taches brun orangé, brun pâle à brun rougeâtre au sec, à arêtes grossièrement serrulées, irrégulièrement lacérées

Pied: sans anneau, absent ou rudimentaire, latéral, tomenteux, gris-brun

Chair: mince, sauf au point d'attache, ferme, tenace, blanchâtre, chamois rosâtre à brunâtre, souvent à reflet duplex, avec ligne noire délimitant le pileipellis densément laineux et la chair

Odeur: indistincte ou assez forte, faiblement ou modérément aromatique à légèrement épicée, souvent fruitée

Saveur: fortement âcre à poivrée

Habitat: juillet-novembre, souvent grégaire, cespiteux ou en amas imbriqués, parfois solitaire, saprotrophe, sur bois pourri de feuillus, parfois apparemment de conifères, souvent en milieux ombragés humides des forêts denses

Remarques: Son genre se reconnaît à ses lames typiquement denticulées

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophage > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied latéral ou excentrique > Chapeau lisse et pied latéral > Chapeau sans couche gélatineuse

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Russulales > Auriscalpiaceae > *Lentinellus* > *Lentinellus ursinus*

Photos:



