

# Clavaire cendrée



**Comestible, sans valeur**

Recommandation officielle:  **NON COMESTIBLE**

*Nom latin: Clavulina cinerea*

*Famille: Autres > Ramariaceae > Ramaria*

*Caractéristiques du genre Ramaria : chapeau: ramifié, généralement jaunâtre, ocre à rose saumon, chair cassante - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur terre ou bois, certaines espèces sont toxiques, voir Clavulina*

- Synonymes:** Corallium cinereum, Ramaria cinerea, Clavaria cinerea
- Chapeau:** 3-10cm, en forme de petit buisson peu ramifié ou de "bois de cerf" minuscule, à petits rameaux aplatis, arrondis et plus ou moins ridés à plissés, extrémités arrondies plutôt qu'en pointes fourchues, de couleur gris blanchâtre à gris cendré à reflets ochracés à lilas
- Lamelles:** sans lames
- Pied:** sans anneau, tronc de la même couleur que le chapeau, duquel partent les rameaux
- Chair:** blanc gris
- Odeur:** neutre
- Saveur:** douce
- Habitat:** septembre-novembre, souvent enfoui ou caché par les feuilles mortes, se développe généralement en troupes de quelques individus
- Remarques:** assez commun en fin de saison
- Confusion:** Clavaire crêtée (*Clavulina cristata*)  
*couleur*
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chair non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair fragile ferme et cassante > Pied moyen à épais > Tronc ramifié > Rameaux à section circulaire > Plus de 5-6 cm, tronc très ramifié > Ramaria
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Cantharellales > Hydnnaceae > Clavulina

## Photos:



Photos micro:

