

# Cystoderme dents-de-requin, Cystoderme dentelé



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

*Nom latin: Cystoderma carcharias*

*Famille: A lames > Tricholomataceae > Cystoderma*

*Caractéristiques du genre Cystoderma : chapeau: couleur variée, sec, grenu, pelable - lames: adnées, claires, trame régulière - pied: épais à mince, farineux-grenu, zone annulaire floconneuse ou anneau membraneux - remarques: saprophyte, terrestre, aspect de lépiote*

- Synonymes:** Lepiota carcharias, Lepiota granulosa var. carcharias, Agaricus granulatus var. carcharias, Agaricus carcharias, Agaricus carcharius
- Chapeau:** 2-5cm, un peu mamelonné au centre, conique-obtus à conique-campanulé puis convexe à étalé, incarnat, crème rosé ou brun roussâtre, plus brun au milieu et plus pâle au bord, nuancé de gris, rarement blanc, surface ponctuée de fins granules réguliers, farineux, plus rares sur le bord, parfois un peu ridée, mais jamais de façon bien frappante, marge avec débris de voile
- Lamelles:** assez serrées, adnées ou légèrement décurrentes, crème blanchâtres, puis crème jaunâtre, avec lamellules, arêtes entières
- Pied:** avec anneau (armille), incarnat roussâtre (plus pâle que le chapeau), un peu pruineux en haut au-dessus de l'armille, forme typique de gaine remontante, en entonnoir, sur les deux tiers inférieurs, collerette membraneuse, ponctuée-granuleuse comme le chapeau, égal, parfois légèrement élargi vers la base, plein, farci puis creux, lisse soyeux et blanc au-dessus de l'anneau, de plus en plus granuleux-écailleux et blanchâtre à crème parfois teinté de rose de la base jusqu'à l'anneau
- Chair:** épaisse au disque, amincie vers la marge, ferme, sec, blanche à blanchâtre
- Odeur:** faible, désagréable de poussière de grange, moisi, de gaz ou de terre
- Saveur:** douce ou désagréable
- Habitat:** septembre-novembre, bois clair de feuillus et de conifères, sur toute espèce de terrain, commun
- Remarques:** espèce caractérisée par son odeur et son anneau
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles adnées ou échancrées > Chapeau moins de 4 cm > Avec anneau granuleux > Cystoderma
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Agaricaceae > Cystoderma

## Photos:

