

Polypore alvéolé



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Neofavolus alveolaris*

Famille: A tubes > Polyporaceae > Polyporus

Caractéristiques du genre *Polyporus* : chapeau: coriace, élastique, sec, feutré à écailleux - lames: tubes en couches minces - pied: central ou excentrique - remarques: lignicole, saprophyte, plus rarement parasite, provoque une pourriture blanche

Synonymes: -

Chapeau: 6-10cm, souvent légèrement enfoncé latéralement, sessile, dimidié, semi-circulaire, réniforme, conchoïde à flabelliforme, ovoïde, étalé, légèrement déprimé au centre à infundibuliforme, souvent concave vers la base, sec, fibrilleux radialement à écailleux, avec écailles triangulaires apprimées et légèrement plus foncées au début, glabre et lisse avec l'âge, azoné ou avec sillons indistinctement concentriques, brun orangé, jaune rougeâtre pâle à orange rougeâtre au début, blanchâtre sordide, crème, ivoire à chamois pâle avec l'âge, à marge longtemps incurvée à enroulée, mince, aiguë, puis droite, ondulée et irrégulièrement lobée, nettement délimitée, glabre à légèrement frangée, concolore

Lamelles: sans lames, face poroïde blanchâtre, crème à orange grisâtre au frais, jaunâtre à tan au sec, pores decurrents, hexagonaux, alvéolés, allongés radialement, en forme de diamant, grands, disséminés minces, entiers, légèrement lacérés avec l'âge, couche de tubes adnée à subdecurrente, continue au contexte, blanchâtre, jaunâtre à tan blanchâtre

Pied: typiquement rudimentaire, court, excentré à latéral, parfois centré, égal, légèrement élargi vers la base, court, plein, glabre, lisse, souvent couvert de pores, blanc, crème, chamois à brunâtre

Chair: mince, tenace et flexible au frais, subéreux, subéreux à cassant au sec, azoné, blanc, ivoire à tan pâle, immuable à la coupe

Odeur: neutre

Saveur: douce à amarescente

Habitat: avril-juillet, solitaire, dispersé ou grégaire, en petits groupes, serrés soudés à la marge du chapeau, saprotrophe sur bois mort de nombreux arbres et arbustes feuillus

Remarques: se caractérise par ses très grandes pores

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chaire dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied central et grêle > Chapeau écailleux > Polyporus

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > Neofavolus

Photos:

