

## Lactaire à toison, Lactaire à coliques



**Comestible, mais sans valeur**

*Nom latin: Lactarius torminosus*

*Famille: A lames > Russulaceae > Lactarius*

*Caractéristiques du genre Lactarius : chapeau: fragile, exudant un lait à la cassure, nu à velu, sec ou poisseux, cernes concentriques fréquents - lames: fragiles - pied: cylindrique, vite creux - remarques: mycorrhizien, on peut goûter de petits morceaux pour la détermination*

- Chapeau:** 4-10cm, convexe puis étalé et déprimé au centre, à marge enroulée, de couleur rose chair, rose orangé à rose orangé pâle, à zones concentriques plus foncées, à feutrage (peluches) surtout visible sur ses bords chez les sujets jeunes, cuticule un peu poisseuse, marge longuement enroulée
- Lamelles:** blanches à crème pâle, lait restant blanc, peu décurrentes, fines, serrées
- Pied:** sans anneau, rapidement creux, duveteux, de même couleur ou plus pâle que le chapeau
- Chair:** blanche, exsude un lait blanc très âcre à la coupe
- Odeur:** fruitée, de pomme
- Saveur:** très piquante
- Habitat:** août-octobre, sous bouleau, sol acide, sableux, argileux, assez fréquent
- Remarques:** immangeable vu son âcreté, contient une résine piquante qui peut provoquer nausées, diarrhée et vomissement, certains le surnomme d'ailleurs Lactaire à coliques. Après avoir été lavé plusieurs fois et cuit, il peut être salé et conservé au vinaigre. Il est membre d'une famille comportant de nombreux types dont deux seulement sont intéressants : le lactaire délicieux et surtout le lactaire sanguin
- Confusion:** Lactaire pubescent (*Lactarius pubescens*)
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair cassante comme de la craie > Avec lait (latex) qui s'écoule à la cassure > Lactarius