

Pleurote petit nid



Comestible, sans valeur



NON COMESTIBLE


Nom latin: *Phyllotopsis nidulans*

Famille: A lames > *Tapinellaceae* > *Tapinella*

Caractéristiques du genre *Tapinella*: chapeau: flabelliforme, conchoïde, convexe ou déprimé, feutré à velouté, souvent glabrescent, dans les tons de beige, brun olivâtre, brun ocré, brun orangé à cannelle, à marge enroulée au début - lames: décurrentes ou radiantes d'un point d'attache, serrées, fourchues, anastomosées près du pied, détachables de la chair, pâles, jaunâtres puis jaune-brun, brunes à la fin - pied: centré, excentré latéral, absent ou rudimentaire, velouté et brun foncé à noirâtre lorsque distinct - remarques: chair blanchâtre, crème à jaunâtre, odeur indistincte

- Synonymes:** *Panus nidulans*, *Dendrosarcus nidulans*, *Pocillaria foetens*, *Agaricus odorativus*, *Crepidotus jonquilla*, *Claudopus nidulans*, *Crepidotus nidulans*, *Pleurotus nidulans*, *Agaricus jonquilla*, *Panus foetens*, *Agaricus nidulans*, *Dendrosarcus mollis*
- Chapeau:** 2-7cm, flabelliforme, conchoïde, semi-circulaire, réniforme à linguiforme, souvent attaché latéralement ou par le pied, largement convexe à étalé, couvert d'un tomentum feutré blanc à chamois au début, sec, jaune orangé à chamois orangé à l'humidité, orangé brunâtre à jaune ocre au sec, à marge longtemps enroulée, irrégulièrement ondulée, tomenteuse-villeuse
- Lamelles:** radialement excentrées à partir d'un point d'attachement, étroites à larges, avec lamellules, serrées, chamois orangé, jaune orangé à jaune rouille
- Pied:** sans anneau, sans pied ou rudimentaire, souvent tomenteux-strigieux blanc à la base
- Chair:** mince, tenace, élastique, jaunâtre
- Odeur:** typiquement forte, désagréable, de chou pourri ou de gaz d'éclairage, parfois douce
- Saveur:** saveur désagréable, amère, parfois douce ou fongique
- Habitat:** juin-novembre, grégaire ou en amas imbriqués, rarement solitaire, saprotrophe, sur bois pourrissant de feuillus, souvent en très grand nombre sur un même tronc
- Remarques:** reconnaissable à son odeur et sa saveur désagréables
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > En forme de moule, pied latéral réduit > Marge enroulée > *Tapinella*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Phyllotopsidaceae > *Phyllotopsis*

Photos:



Paxille faux-panus



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Tapinella panuoides*

Famille: *A lames > Tapinellaceae > Tapinella*

Caractéristiques du genre *Tapinella*: chapeau: flabelliforme, conchoïde, convexe ou déprimé, feutré à velouté, souvent glabrescent, dans les tons de beige, brun olivâtre, brun ocré, brun orangé à cannelle, à marge enroulée au début - lames: decurrentes ou radiantes d'un point d'attache, serrées, fourchues, anastomosées près du pied, détachables de la chair, pâles, jaunâtres puis jaune-brun, brunes à la fin - pied: centré, excentré latéral, absent ou rudimentaire, velouté et brun foncé à noirâtre lorsque distinct - remarques: chair blanchâtre, crème à jaunâtre, odeur indistincte

Synonymes: *Serpula panuoides*, *Plicaturella panuoides*, *Crepidotus panuoides*, *Paxillus acheruntius*, *Rhymovis panuoides*, *Paxillus panuoides*, *Agaricus panuoides*, *Agaricus acheruntius*

Chapeau: 2-12cm, conchoïde, pétaloïde à flabelliforme, non visqueux, finement fibrilleux à velouté au début, hirsute à la base, vite glabre, fris, chamois, jaunâtre sombre, jaune-brun à brun orangé au frais, jaune olive, brun pâle à ocre sombre au sec, non noir, à marge incurvée au début, puis droite, souvent lobée à ondulée et légèrement crénelée

Lamelles: radiantes à partir d'un point d'attache, relativement étroites, souvent crispées à ondulées, fourchues à interveinées, surtout près du pied et avec l'âge, apparaissant parfois poroïdes à maturité, facilement détachables de la chair, avec lamellules peu différenciées, serrées, jaunâtre pâle ou sombre à jaunes au frais, orangé terne, brunâtres, ocres, olivacées à brun olive au sec, immuables, à arêtes entières

Pied: sans anneau, pied absent ou rudimentaire, comme petite base latérale, atténuée

Chair: mince, ferme puis flasque, blanchâtre à crème au frais, olive pâle, jaunâtre sombre à ochracée au sec, non noire, fonçant à la coupe

Odeur: indistincte, agréable, fruitée ou résineuse

Saveur: indistincte, agréable à amarescente

Habitat: juin-novembre, sur bois mort de conifères, parfois copeaux de bois et humus riche en lignine, solitaire, grégaire ou en amas imbriqués, occasionnel

Remarques: trop ferme pour être mangé

Confusion: Paxille à pied noir, Paxille à pied de velours (*Tapinella atrotoomentosa*)

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > En forme de moule, pied latéral réduit > Marge enroulée > *Tapinella*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Serpulaceae > *Serpula*

Photos:

