

# Polypore du sapin, Phellin de Hartig



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

Nom latin: *Phellinus hartigii*

Famille: A tubes > Hymenochaetaceae > *Phellinus*

Caractéristiques du genre *Phellinus* : chapeau: console ou nul (résupiné), toujours pluriannuel, sans croûte distincte, chair brun-roux à roux, ligneuse - lames: tubes brun-roux à bruns - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois et parasite de faiblesse, provoque une pourriture blanche

**Synonymes:** *Fomitiporella hartigii*, *Fomitiporia hartigii*, *Phellinus robustus* f. *hartigii*, *Phellinus robustus* var. *hartigii*, *Fomes robustus* f. *pinuum*, *Fomes hartigii*, *Polyporus hartigii*, *Ochroporus fulvus*

**Chapeau:** 5-20cm, fructification tuberculeuse, ou pulvinée au début, puis en forme de console ou de sabot de cheval chez l'adulte, hyménophore parfois oblique, largement fixée au support, surface piléique lisse, croûteuse, à peine marquée de vagues sillons concentriques, sans bourrelets, dépourvue de profondes crevasses radiales, sauf parfois dans la vétusté, croûte chagrinée, souvent guttulée-scrobiculée, brun vineux à brun jaunâtre sombre ou noirâtre, marge obtuse, ocre-brun, sans rebord ni arête vive, busquée, en retrait

**Lamelles:** néant, pores sur la face inférieure finement porée, pores étroits, arrondis, tubes stratifiés, (chaque couche séparée de la suivante par une mince assise de trame), de longueur variable, lustrés à la coupe, cannelle, jaune rougeâtre, farcis de blanc avec l'âge

**Pied:** sans anneau, sans pied

**Chair:** ligneuse, tenace, très dure, fibreuse, brillante à la coupe, plus foncée que les tubes, jaune-brun à brun fauve ou brun rouillé, disposées en couches horizontales, zonée

**Odeur:** neutre

**Saveur:** neutre

**Habitat:** janvier-décembre, spécifique et parasite de l'Abies, également saprophyte sur branches pendantes ou tombées, sur troncs, souvent à la face infère (exceptionnellement sur Picea, mais toujours dans des lieux humides). Isolés, rarement grégaires. Pérenne. Peu fréquent mais répandu

**Remarques:** provoque une pourriture blanche très active.  
Bien trop dur pour être consommable

**Confusion:** Amadouvier des pins, Polypore marginé (*Fomitopsis pinicola*)  
Amadouvier, Polypore allume-feu (*Fomes fomentarius*)  
*Amadouvier: pousse sur feuillus, Polypore du sapin: pousse sur résineux*

**Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Dépassant le support de plus de 15 cm > Pluriannuel, chair brun-roux > *Phellinus*

**Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Hymenochaetales > Hymenochaetaceae > *Fomitiporella*

## Photos:

