

Hydne violet



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Sarcodon joeides

Famille: A aiguillons > Thelephoraceae > Sarcodon

Caractéristiques du genre Sarcodon : chapeau: face inférieure du chapeau couverte d'aiguillons gris à brunâtres - lames: aiguillons gris à brunâtres - pied: central à excentrique - remarques: mycorrhizien

- Synonymes:** Hydnum commutatum, Hydnum inopinatum, Hydnum roseolum
- Chapeau:** 3-11cm, convexe à convexe-étalé puis étalé, déprimé au centre à profondément concave, sinueux, irrégulièrement arrondi, velouté au début, puis finement fibrilleux-squamuleux, souvent légèrement crevassé avec l'âge, chamois, brun ocre à brun-rose, beige rougeâtre, brun-rouge avec l'âge, à marge incurvée au début, puis ondulée et incisée
- Lamelles:** néant, aiguillons profondément, mais irrégulièrement décurrents, subulées, serrés, brun-rose au début, pourpre brunâtre à brun chocolaté avec l'âge, avec la pointe blanche
- Pied:** sans anneau, parfois excentré, simple ou conné, égal à conique, atténué vers la base, arrondi, presque radicant, plein, velouté puis fibrilleux longitudinalement ou glabrescent, ponctué à finement squamuleux brun-pourpre, vert sombre vers la base, cotonneux blanc à la base
- Chair:** compacte, cassante, non zonée, devenant immédiatement rose pâle à lilas à la coupe, puis violet sombre
- Odeur:** farineuse au frais, de fenugrec au sec
- Saveur:** amarescente à âcre
- Habitat:** août-octobre, sol des forêts de feuillus, sous châtainier et chêne, souvent fasciculé, rarement solitaire, rare
- Remarques:** contrairement à son cousin l'Epervier, il n'est pas comestible car très âcre
- Confusion:** Epervier, Hydne imbriqué, Ecailleux, Sarcodon imbriqué (Sarcodon imbricatus)
- Détermination:** Carpophore > Aiguillons sous le chapeau > Champignon à chair ferme > Pas en forme de touffe > Chapeau unique > Chapeau écailleux, brunâtre > Sarcodon
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Cantharellales > Hydneaceae > Hydnum

Photos:



Sarcodon à pied blanc



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Sarcodon leucopus*

Famille: A aiguillons > Thelephoraceae > Sarcodon

Caractéristiques du genre *Sarcodon* : chapeau: face inférieure du chapeau couverte d'aiguillons gris à brunâtres - lames: aiguillons gris à brunâtres - pied: central à excentrique - remarques: mycorrhizien

Synonymes: Hydnum leucopus

Chapeau: 80-150mm, convexe, surbaissé, déprimé au disque, irrégulier, bosselé. Surface piléique lisse, à cuticule séparable, opaque, sèche, très finement veloutée-aréolée, vite glabre, brillante par endroit, puis finemnt squamuleuse, souvent gercée de profondes crevasses au centre, brun-jaune ou gris-brun, brun noisette, puis pourpre brun à brun noirâtre dans la vétusté. Marge épaisse, incurvée, lobée, échancrée, prolongée par une mince marginelle rabattue à l'intérieur, concolore

Lamelles: sans lame, aiguillon blanchâtres au début, jusqu'à 15mm, brefs vers la marge, peu decurrents, fins, 1 mm de diamètre, denses, subulés, souples, peu fragiles, séparables, gris-jaune à pointe blanche, puis brun violacé noirâtre ou brun d'ombre, la pointe restant pâle. Sporée brun clair.

Pied: cylindrique, excentrique ou latéral, souvent courbé, un peu épaissi à la base, comprimé, plein, dur, poudré-ponctué, glabrescent, plus pâle que le chapeau, blanc grisâtre ou même blanchâtre surtout vers la base, puis se tachant de gris vert, vineux sordide en herbier

Chair: Epaisse dans le chapeau, ferme, compacte, non hygrophane, fibreuse, blanche à blanchâtre, un peu grisâtre lilacin vers la marge et dans le pied

Odeur: chicorée torrifiée ou de Maggi, assez faible, du moins au début

Saveur: douce, puis amer

Habitat: août-octobre, Sous conifères, souvent dans les régions montagnardes et subalpines

Remarques: Devient très amer à la cuisson

Confusion: Polypore blanc et noir (*Boletopsis leucomelaena*)
Polypore: pores, *Sarcodon:* aiguillons

Détermination: Carpophore > Aiguillons sous le chapeau > Champignon à chair ferme > Pas en forme de touffe > Chapeau unique > Chapeau écailleux, brunâtre > Sarcodon

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Thelephorales > Bankeraceae > Sarcodon

Photos micro:

