

Hydne violet



Comestible, mais sans valeur

Nom latin: Sarcodon joeides

Famille: A aiguillons > Thelephoraceae > Sarcodon

Caractéristiques du genre Sarcodon : chapeau: face inférieure du chapeau couverte d'aiguillons gris à brunâtres - lames: aiguillons gris à brunâtres - pied: central à excentrique - remarques: mycorrhizien

- Chapeau:** 3-11cm, convexe à convexe-étalé puis étalé, déprimé au centre à profondément concave, sinueux, irrégulièrement arrondi, velouté au début, puis finement fibrilleux-squamuleux, souvent légèrement crevassé avec l'âge, chamois, brun ocre à brun-rose, beige rougeâtre, brun-rouge avec l'âge, à marge incurvée au début, puis ondulée et incisée
- Lamelles:** néant, aiguillons profondément, mais irrégulièrement décurrents, subulées, serrés, brun-rose au début, pourpre brunâtre à brun chocolaté avec l'âge, avec la pointe blanche
- Pied:** sans anneau, parfois excentré, simple ou conné, égal à conique, atténué vers la base, arrondi, presque radicaire, plein, velouté puis fibrilleux longitudinalement ou glabrescent, ponctué à finement squamuleux brun-pourpre, vert sombre vers la base, cotonneux blanc à la base
- Chair:** compacte, cassante, non zonée, devenant immédiatement rose pâle à lilas à la coupe, puis violet sombre
- Odeur:** farineuse au frais, de fenugrec au sec
- Saveur:** amarescente à âcre
- Habitat:** août-octobre, sol des forêts de feuillus, sous châtainier et chêne, souvent fasciculé, rarement solitaire, rare
- Remarques:** contrairement à son cousin l'Epervier, il n'est pas comestible car très âcre
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Aiguillons sous le chapeau > Champignon à chair ferme > Pas en forme de touffe > Chapeau unique > Chapeau écailleux, brunâtre > Sarcodon

