

Polypore blanc et noir



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Boletopsis leucomelaena*

Famille: A aiguillons > Bankeraceae

Caractéristiques du genre Bankeraceae : chapeau: - lames: - pied: - remarques:

- Synonymes:** Polyporus ovinus subsp. leucomelas, Boletus violaceus, Caloporus leucomelas, Polyporus conspicabilis, Polyporus formatus, Polyporus repandus, Polyporus compactus, Polyporus leucomelas, Polyporus scoparius, Polyporus subsquamosus var. leucomelas, Polyporus subsquamosus var. repandus, Boletus leucomelaena, Boletus leucomelas, Fungus porcinus
- Chapeau:** 4-15cm, convexe puis convexe-étalé, bosselé et souvent irrégulier, sec, plutôt glabre, parfois d'aspect légèrement marbré à strié, azoné, gris, gris foncé à presque noir, teinté de violacé, parfois de jaune, à marge mince, incurvée à droite, ondulée, plus pâle au début
- Lamelles:** sans lame, tubes blanc crème au début, brunissant légèrement avec l'âge, devenant lentement rosâtre puis brunâtre au froissement. Pores anguleux, 2-3 par mm, à disséminations minces puis lacérés. Couche(s) de tubes décurrente, difficilement détachable, très courte, 1-2 mm de longueur
- Pied:** sans anneau, centré à excentré, plein, tenace, lisse ou finement squamuleux avec l'âge, gris, blanchâtre vers l'apex, concolore au chapeau vers la base, parfois avec duvet orangé à la base, atténué à la base
- Chair:** homogène, mou-fibreux au frais, tenace et se casant facilement radialement au sec, blanchâtre, se tachant de gris rosâtre à gris lilas à la coupe, surtout vers la marge, puis grisonnant, 1-3 cm d'épaisseur
- Odeur:** faible, indistincte
- Saveur:** douce, parfois amère, faible
- Habitat:** juillet-octobre, solitaire, dispersé ou grégaire, mycorrhizien, sur sol des forêts herbeuses et riches, parmi les aiguilles d'épicéa, absence de carie du bois
- Remarques:** Ce polypore très particulier ressemble fortement à un bolet, d'où le nom de genre
- Confusion:** Sarcodon à pied blanc (*Sarcodon leucopus*)
Polypore: pores, Sarcodon: aiguillons
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > Polyporus > Polyporus ovinus

Photos:



Hydne tomenteux



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Phellodon tomentosus*

Famille: A aiguillons > Bankeraceae > Phellodon

Caractéristiques du genre *Phellodon* : chapeau: face intérieure du chapeau couverte d'aiguillons élastiques, chair liégeuse, zonée à l'intérieur, odeur (sec) de bouillon de viande ou livèche - lames: aiguillons élastiques - pied: existant mais court - remarques: saprophyte

- Synonymes:** Calodon tomentosus, Calodon cyathiformis, Phellodon cyathiformis, Hydnum leptopus, Hydnum tomentosum
- Chapeau:** 2-6cm, étalé, déprimé, largement infundibuliforme à ombiliqué, sec, lisse à ridulé radialement, squamuleux-hérissé au centre, tomenteux à fibrilleux, feutré, vers la marge, blanc au tout début, typiquement fortement zoné de jaune-brun, brun pâle à foncé, gris-brun à brun rougeâtre, demeurant souvent blanc vers le pourtour, à marge se tachant de brunâtre au froissement
- Lamelles:** sans lames, aiguillons courts, subdécurrents, serrés, blancs puis chamois, grisâtres à gris-brun cendré, plus pâles aux bouts, brunissant ou tachant de chamois vineux au froissement
- Pied:** souvent centré, égal à atténué vers la base, lisse à subfibrilleux, concolore au chapeau, orné de bandelettes crème, brunes à bleutées, arrivant d'une couche mycélienne feutrée brunâtre
- Chair:** coriace-fibreux, brunâtre dans le chapeau, zoné et avec couche externe subéreuse tan brunâtre et couche interne brun foncé dans le pied
- Odeur:** aromatisée, sucrée ou de fenugrec, foin frais, surtout au sec sur le chapeau, spermatique sur les aiguillons
- Saveur:** douce à amarescente, parfois un peu piquante
- Habitat:** août-octobre, dispersé, cespiteux ou souvent en troupes qui se fondent les uns dans les autres, mycorhizien, sur sol des forêts de conifères et pins, appréciant la bruyère et les terres acides, assez rare
- Remarques:** Ses pieds se séparent même si plusieurs chapeaux sont fusionnés ensemble
- Confusion:** Hydne scrobiculé (*Hydnellum scrobiculatum*)
plus petit
- Détermination:** Carpophore > Aiguillons sous le chapeau > Champignon à chair ferme > Pas en forme de touffe > Chapeaux imbriqués, chair ligneuse > Odeur de bouillon de viande > Phellodon
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Thelephorales > Bankeraceae > Calodon

Photos:

