Trémelle à spores jaunes

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Dacrymyces chrysospermus

Famille: Autres > Tremellaceae

Caractéristiques du genre Tremellaceae : chapeau: - lames: - pied: - remarques:

Synonymes:	-
Chapeau:	2-5cm, de forme très variable, pulviné, en masse ± cérébriforme, multilobé, obconique, discoïde à étalé sur le substrat, lisse mais couvert de poils blanchâtres lâchement disposés au-dessus, jaune brillant à orangé au frais, rouge orangé à rougeâtre au sec, avec base réduite distincte ou radicante près du point d'attache, blanchâtre, à marge enroulée
Lamelles:	sans lames
Pied:	sans anneau, sans pied
Chair:	gélatineuse-tenace au début, gélatineuse-molle avec l'âge, corné au sec, jaune
Odeur:	indistincte
Saveur:	indistincte
Habitat:	juin-novembre, solitaire, grégaire ou densément cespiteux, parfois confluent, saprotrophe, sur bois pourri de conifères
Remarques:	Son fère jumeau la Tremelle mésentérique poussse sur bois de feuillus
Confusion:	Trémelle mésentérique (Tremella mesenterica) *Trémelle à spores jaunes: sur résineux* *Trémelle mésentérique: sur feuillus*
Classification:	Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Dacrymycetes > Dacrymycetales > Dacrymycetaceae > Dacrymyces

Photos:

Guépinie en helvelle, guépinie rousse, oreille de veau

Comestible **Recommandation officielle:** COMESTIBLE

Nom latin: Guepinia helvelloides

Famille: Autres > Tremellaceae > Tremella

Caractéristiques du genre Tremella : chapeau: lobé, en masse plus ou moins tuberculeuse, gélatineuse, rarement avec noyau ferme, corné en séchant, face externe avec couche fertile - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche, rarement parasite sur d'autres champignons

Synonymes: Tremiscus helvelloides, Phlogiotis helvelloides, Gyrocephalus helvelloides, Tremella helvelloides, Tremella rufa

Chapeau: 3-15cm, dressé, formé d'une tête et d'un pied, en entonnoir fendu sur un côté, forme d'oreille, cornet ou spatule tordu ou langue, à rebord supérieur en éventail et marge ondulée, translucide, rose pâle à foncé, saumon, rouge orangé à abricot, puis roussâtre, souvent plus pâle vers la marge, à face interne lisse et mate, parfois pruineuse blanchâtre, à face externe lisse, plus rose-violacée, souvent ridulée-veinée avec l'âge

Lamelles: néant, face externe lisse, plus rose-violacée, souvent ridulée-veinée avec l'âge

Pied: sans anneau, rudimentaire, court, excentré à latéral, de même texture que le chapeau, allongé en forme de gouttière ouverte du haut en bas. Avec l'âge, il devient plus sinueux, voire même lobé et se termine en un demi-entonnoir. Il est assez épais de couleur orange, tirant ensuite sur le roux.

Chair: ferme, un peu élastique, translucide, gélatineuse, elle devient brune et cassante en se désséchant, sa surface est lisse, ou presque pas rugueuse, d'aspect pruineux

Odeur: faible

Saveur: douce

Habitat: juillet-octobre, sol ou bois pourri et enfoui de conifères, en milieu humide et ombragé, humus, mousses, bord de sentier, buisson et coupe de bois, sol calcaire, relativement commun en montagne, bien plus rare en plaine

Remarques: consommée crue en salade, à conserver au vinaigre

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Conservation: Conserve de vinaigre/vin blanc: pour accompagner un plat de fromage, ou dans la salade

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chaire non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair non cassante, souple ou gélatineuse, cartilagineuse > Tronc ramifié > Rameaux aplatis, en lanières ou difformes > Rameaux contournés, ocracés à jaunâtres > Sur bois, masse de feuillets gélatineuse, petite taille > Tremella

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae > Auriculariales > Exidiaceae > Tremiscus

Photos:

Trémelle gélatineuse, Trémellon gélatineux

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** COMESTIBLE

Nom latin: Pseudohydnum gelatinosum

Famille: Autres > Tremellaceae > Tremella

Caractéristiques du genre Tremella : chapeau: lobé, en masse plus ou moins tuberculeuse, gélatineuse, rarement avec noyau ferme, corné en séchant, face externe avec couche fertile - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche, rarement parasite sur d'autres champignons

Synonymes: Tremellodon auriculatum, Tremellodon auriculatus, Tremellodon gelatinosum, Tremellodon gelatinosus, Hydnogloea gelatinosa, Exidia gelatinosa, Hydnum auriculatum, Steccherinum gelatinosum, Hydnum clandestinum, Hydnum gelatinosum

Chapeau: 3-7cm, convexe étalé à étalé difforme, linguiforme ou en éventail, à marge fine et un peu onduleuse, à cuticule lisse à finement ruguleuse ou pubescente voire parfois hérissée de minuscules petites pointes, de couleur brun grisâtre pâle, brun fauvâtre pâle ou ochracé pâle plus ou moins translucide, plus rarement blanchâtre

Lamelles: néant: aiguillons épais et assez serrés, de consistance gélatineuse, de couleur blanche, débordant parfois jusque sur la marge

Pied: sans anneau, pied inexistant ou très court et latéral, translucide et de même couleur à un peu plus foncé que l'hyménium

Chair: blanchâtre translucide, gélatineuse à caoutchouteuse

Odeur: nulle à faible mais non caractéristique

Saveur: résineuse

Habitat: août-novembre, essentiellement sur le bois pourri, les troncs et surtout les souches de conifères, principalement en petites troupes de quelques individus plus ou moins imbriqués mais parfois aussi isolément. Lieux bien humides et froids, assez commun par endroit.

Remarques: sa consistance molle et son petit goût de résine assez particulier ne l'empêchent pas d'être comestible mais de qualité assez médiocre. Peut être mangé en salade (avec une sauce bien relevée) après avoir été blanchi.

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chaire non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair non cassante, souple ou gélatineuse, cartilagineuse > Tronc ramifié > Rameaux aplatis, en lanières ou difformes > Rameaux contournés, ocracés à jaunâtres > Sur bois, masse de feuillets gélatineuse, petite taille > Tremella

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae > Auriculariales > Exidiaceae > Tremellodon

Photos:

Photos micro:





Trémelle mésentérique

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Tremella mesenterica

Famille: Autres > Tremellaceae > Tremella

Caractéristiques du genre Tremella : chapeau: lobé, en masse plus ou moins tuberculeuse, gélatineuse, rarement avec noyau ferme, corné en séchant, face externe avec couche fertile - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche, rarement parasite sur d'autres champignons

Synonymes: Oncomyces mesenterica, Tremella mesenterica var. lutescens, Tremella quercina, Tremella lutescens, Elvela mesenterica

Chapeau: 2-7cm, en masse arrondie cérébriforme, variablement lobée, ondulée à tuberculée, avec plis disposés en fascicules, en minces lobes papyracés et lisses avec l'âge, souvent visqueux, translucide, jaune pâle, jaune, jaune or à jaune orangé, parfois blanchâtre, en film orangé à rougeâtre foncé et dur au sec

Lamelles: néant, sporée blanchâtre à jaune pâle

Pied: sans anneau, pas de pied

Chair: tenace-gélatineuse à tendre

Odeur: nulle

Saveur: nulle

Habitat: janvier-décembre, parasite, sur bois pourri de feuillus, branches tombées, troncs et souches

Remarques: Vient surtout par temps très humide.
Son frère jumeau Trémelle à spores jaunes, Dacrymyces chrysospermus pousse sur résineux

Confusion: Trémelle à spores jaunes (Dacrymyces chrysospermus)
Trémelle à spores jaunes: sur résineux
Trémelle mésentérique: sur feuillus

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chaire non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair non cassante, souple ou gélatineuse, cartilagineuse > Tronc ramifié > Rameaux aplatis, en lanières ou difformes > Rameaux contournés, ocracés à jaunâtres > Sur bois, masse de feuillets gélatineuse, petite taille > Tremella

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae > Auriculariales > Auriculariaceae > Oncomyces

Photos:

Exidie noirâtre

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Exidia nigricans

Famille: Autres > Tremellaceae > Exidia

Caractéristiques du genre Exidia : chapeau: masse irrégulière, variable, gélatineuse, se rétrécissant et devenant cornée et séchant, couche fertile avec verrues d'aspect glanduleux - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche

Synonymes: Exidia plana

Chapeau: 1-1.5cm, pulviné, glanduleux, vésiculeux à lobé-ondulé et presque incolore au début, puis souvent étalé, cérébriforme, fusionnant en masse irrégulière extensive plissée ou lobée, souvent jusqu'à 50 cm de longueur, sessile, gélatinisé, à face externe lisse à légèrement rugueuse, translucide, luisante au frais ou mate,

Lamelles: sans lames

Pied: sans anneau, sans pied

Chair: gélatineuse, molle, parfois transparente, se rétrécit sèche et racornit au sec

Odeur: nulle

Saveur: nulle

Habitat: janvier-décembre, grégaire ou en rangée et souvent confluent, saprotrophe, sur bois vivant ou mort de feuillus, branches au sol et découpes des troncs, plus rarement blessures d'arbres vivants

Remarques: composé de nombreux petits carpophores s'imbriquant pour former une couche épaisse de 5 à 15 mm., longue jusqu'à 10 - 20 cm ou plus jusqu'à pouvoir recouvrir toute la longueur d'une branche. Aussi appelé Beurre de sorcière

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair molle, irrégulière, presque gluante > Chair non jaune > Exidia

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae > Auriculariales > Exidiaceae > Exidia

Photos:

Exidie portière

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Exidia thuretiana

Famille: Autres > Tremellaceae > Exidia

Caractéristiques du genre Exidia : chapeau: masse irrégulière, variable, gélatineuse, se rétrécissant et devenant cornée et séchant, couche fertile avec verrues d'aspect glanduleux - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche

Synonymes: Heterochaete europaea, Tremella thuretiana

Chapeau: 2-10cm, formant une masse gélatineuse ressemblant à une cervelle de couleur blanche, translucide, hérissé de mèches papilliformes, gélatineux ferme, puis discoïde et étalé, ou allongé, étroitement appliqué au substrat à l'état frais,souvent appliqué dans l'axe de la branche, en forme de bouton dans la jeunesse, bords libres, ciliés et villeux en dessous, blanc opalin . Hyménium lisse, puineux, à la fin subliquescent, uniforme, fauvâtre sur le sec. Surface bosselée, ondulée, blanche à bleuâtre opaline, avec parfois une petite teinte ocre ou rose, parfois zonées de couleurs ochracées

Lamelles: néant : surface lisse mais cabossée, de couleur blanche et translucide

Pied: sans anneau, sans pied

Chair: Gélatineuse, coriace

Odeur: indistincte

Saveur: indistincte

Habitat: décembre-mai, branches tombées ou tenant à l'arbre, cortiquées ou non, à la face inf. ou sup. de divers feuillus

Remarques: Egalement synonymisé avec Exidia albida par certains auteurs

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair molle, irrégulière, presque gluante > Chair non jaune > Exidia

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae > Auriculariales > Exidiaceae > Heterochaete

Photos:

Photos micro:
























Cheveux d'anges

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Exidiopsis effusa

Famille: Autres > Tremellaceae > Exidia

Caractéristiques du genre Exidia : chapeau: masse irrégulière, variable, gélatineuse, se rétrécissant et devenant cornée et séchant, couche fertile avec verrues d'aspect glanduleux - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche

Synonymes: Exidiopsis grisea var. effusa, Myxarium nucleatum var. laccatum, Myxarium laccatum, Exidiopsis laccata, Sebacina uvida subsp. peritricha, Sebacina laccata, Exidiopsis peritricha, Sebacina peritricha, Sebacina effusa, Sebacina quercina, Thelephora effusa

Chapeau: 0.3mm, en forme de croûte, céracée à l'état frais, formant comme un enduit savonneux, très finement pelliculaire à l'état sec, se présente sous forme de petites taches irrégulières qui finissent par confluer, marge irrégulière mais nettement limitée

Lamelles: sans lames, surface hyméniale lisse et mate, séparable en fine membranule fragile, pruineuse, rose-clair, fleur de pêcher, argenté-bleuâtre, gris blanchâtre, décoloré pâle au séchage

Pied: sans anneau, sans pied

Chair: peu ou à peine gélatineuse

Odeur: neutre

Saveur: neutre

Habitat: janvier-décembre, en foret, sur branches mortes de feuillus, principalement hêtre, pas rare, toute l'année, surtout en périodes humides, plus abondant dans les régions montagneuse, non lignivore.

Remarques: Responsable des cheveux d'anges lorsque les conditions météo sont favorables, temps humide et gelées légères

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair molle, irrégulière, presque gluante > Chair non jaune > Exidia

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae > Auriculariales > Exidiaceae > Myxarium > Myxarium nucleatum