

Fuligo blanche, crachat de coucou



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Fuligo candida*

Famille: Autres > Physaracae > *Fuligo*

Caractéristiques du genre *Fuligo*: chapeau: en forme de mousse - lames: inexistant, spores noires - pied: inexistant - remarques: entre le règne des champignons et des protozoaires

Synonymes: -

Chapeau: 5cm, masse blanche, plasmode ressemblant à une mousse au chocolat blanc, pulviné, largement étalé, incrusté de calcaire granuleux, fragile, cassant, s'émiettant facilement, formant une masse irrégulière, blanc à blanchâtre, parfois crème à grisâtre

Lamelles: sans lames

Pied: sans anneau, sans pied

Chair: formé de filaments abondants, réticulés, délicats, légèrement élastiques, hyalins, reliés par des noeuds calcaires assez petits, parfois dispersés à presque absents, parfois seulement sous plusieurs granules calcaires agglutinés à l'intérieur des tubes capillitiaux, blancs

Odeur: neutre

Saveur: neutre

Habitat: juin-novembre, commun par région, solitaire, saprotrophe, sur bois pourri, écorces, sciures et copeaux de bois, moins fréquent sur autres substrats

Remarques: Ce *Fuligo* a une belle couleur blanche qui aide à son identification. Il est considéré comme une variété de *F. septica* par plusieurs auteurs.

Confusion: Fleur de tan (*Fuligo septica*)
couleur

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair molle, irrégulière, presque gluante > Chair jaune > *Fuligo*

Classification: -

Photos:



Fleur de tan



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Fuligo septica

Famille: Autres > Physaraceae > Fuligo

Caractéristiques du genre Fuligo: chapeau: en forme de mousse - lames: inexistant, spores noires - pied: inexistant - remarques: entre le règne des champignons et des protozoaires

Synonymes: Fuligo septica f. rufa, Fuligo septica f. candida, Fuligo septica var. candida, Fuligo septica var. rufa, Aethalium septicum var. rufum, Aethalium rufum, Reticularia rufa, Aethalium septicum, Aethalium candidum, Aethalium violaceum, Aethalium septicum f. rufum, Aethalium septicum f. violaceum, Fuligo violacea, Fuligo candida, Fuligo rufa, Reticularia septica, Mucor septicus

Chapeau: 2-20 cm, parfois très grand, jusqu'à 500-600 cm², pulviné, irrégulier, jaune brillant, exsudant des gouttelettes brun-rouge à maturité, souvent assez épais, calcaire, fragile, friable, spongieux, rugueux, alvéolé, détachable, formé de filaments grêles, hyalins, parfois peu nombreux, reliés à des nœuds calcaires fusiformes, uniformes, parfois rares ou peu développés, blancs, jaunes à rougeâtres

Lamelles: néant

Pied: sans anneau, néant

Chair: jaune, déliquescente en vieillissant, aspect devenant visqueuse et vitreuse

Odeur: neutre

Saveur: neutre

Habitat: juin-novembre, bois mort humide, troncs, écorces, racines, sciures, débris végétaux, feuilles mortes et sol, parfois plantes vivantes, solitaire ou grégaire, commune



Remarques: cette espèce ne fait plus aujourd'hui partie du règne des champignons, rampe littéralement sur son support pour se nourrir

Confusion: Fuligo blanche, crachat de coucou (Fuligo candida)
couleur

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair molle, irrégulière, presque gluante > Chair jaune > Fuligo

Classification: Protozoa > Myxomycota > Myxomycetes > Physarales > Physaraceae > Fuligo > Fuligo septica

Photos:





Photos micro:

